

សៀវភៅណែនាំ

Field Guide

ប្រព័ន្ធប្រពលនប្បកម្មដំណាំស្រូវ

System of Rice Intensification



សៀវភៅកៅណែតាំ

Field Guide

ប្រព័ន្ធប្រកលវប្បកម្មដំណាំស្រូវ

System of Rice Intensification

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ប៊ុន ហ៊ុន

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

២០១២

អារម្ភកថា

មើលឃើញវាលស្រែស្មុតក្រៀមនារដូវប្រាំង ដោយខ្វះ
ទឹកស្រោចស្រព **សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន**
បានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ថា នេះគឺជាសក្តានុពល ដ៏ធំធេងដែល
កម្ពុជា មិនទាន់បានប្រើប្រាស់ ។

នៅក្រោមក្រសែភ្នែកដ៏មុតស្រួចរបស់រដ្ឋបុរស សក្តានុ
ពលដែលនៅលាក់កប់ពីក្រោមបញ្ហាប្រឈមដ៏ស្រួចស្រាវ ត្រូវ
បានគាស់រម្មេច ហើយប្រែក្លាយទៅជាកាលានុវត្តភាពដ៏កម្រ
និងដ៏សម្បើមសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ ។

ផ្ដើមចេញពីនេះ **សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ**
នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានប្រកាសប្រកប
ដោយមហិច្ឆិតា អំពីចក្ខុវិស័យរបស់សម្តេច ដែលចង់ឲ្យកម្ពុជា
ក្លាយជាប្រទេសនាំចេញ "**អង្ករ-មាសស**" យ៉ាងសំខាន់នៅលើ
ទីផ្សារអន្តរជាតិនៅក្នុងអនាគតមិនយូរប៉ុន្មានខាងមុខ ។

ក្នុងន័យនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់យកឆ្នាំ ២០១៥
ជាឆ្នាំគោលដើម្បី : (១) ជំរុញការផលិតស្រូវលើសឲ្យបាន
ច្រើនជាង ៤លានតោន ក្នុងនោះបរិមាណអង្ករសម្រាប់
នាំចេញ ត្រូវសម្រេចឲ្យបានយ៉ាងតិច ១លានតោន និង (២)
ធ្វើឲ្យអង្ករ កម្ពុជា ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ ។

ស្របតាមចក្ខុវិស័យខាងលើរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ មានតួនាទីដ៏សំខាន់
ដើម្បីធានាឲ្យបាននូវសុវត្ថិភាពស្បៀង សំរាប់ប្រជាពលរដ្ឋ
គ្រប់រូប ធ្វើឲ្យកំណើននៃផលិតកម្មកសិកម្មមាននិរន្តរភាព
ជំរុញការកែច្នៃ និងរកទីផ្សារសំរាប់ផលិតផលកសិកម្ម ។
ដើម្បីចូលរួមសម្រេចនូវគោលដៅនេះ ខ្ញុំបាទបានចងក្រងនូវ

សៀវភៅណែនាំស្តីពី "ប្រព័ន្ធប្រពល វប្បកម្មដំណាំស្រូវ"
 នេះសម្រាប់ជាត្រីវិស័យក្នុងការអប់រំ បណ្តុះបណ្តាលដល់អ្នក
 ផ្សព្វផ្សាយ និងកសិករក្នុងគោលបំណងលើកស្ទួយកំរិតយល់
 ដឹងរបស់គាត់អំពីបច្ចេកទេសសមស្រប និងការថែរក្សានូវ
 ប្រព័ន្ធនៃការដាំដុះដំណាំស្រូវ ដែលប្រើប្រាស់ទុនផលិតទាប
 តែធានាបាននូវទិន្នផលខ្ពស់ និងគុណភាពបរិស្ថានល្អប្រសើរ។
 សៀវភៅណែនាំនេះ បានរៀបចំ និងចងក្រងឡើង
 តាមរយៈការស្រាវជ្រាវបណ្ណាល័យសាស្ត្រ និងប្រមូល
 បទពិសោធន៍របស់កសិករនៅ ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ ។
 ខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថា សៀវភៅណែនាំ
 នេះនឹងផ្តល់នូវគំនិតថ្មីជាច្រើនដល់កសិករ ក្នុងការកែលំអ
 ផលិតកម្មដំណាំស្រូវ ដែលយើងទាំងអស់គ្នាតែងគិតថា
 ស្រូវ គឺជាធនាគារ របស់កសិករ ។

សូមអរគុណ
 រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២

មាតិកាអត្ថបទ

ចំណងជើងអត្ថបទ	ទំព័រ
សៀវភៅណែនាំ	១
អារម្ភកថា	៣
មាតិកាអត្ថបទ	៥
១- ប្រវត្តិរបស់ប្រព័ន្ធប្រពលវប្បកម្មដំណាំស្រូវ	៧
២- ដំណាក់កាលលូតលាស់របស់ដំណាំស្រូវ	៨
ក- វគ្គលូតលាស់	៨
ខ- វគ្គបង្កើតផល	៩
គ- វគ្គទុំ	១០
៣- គោលការណ៍ និងបច្ចេកទេសរបស់ប្រព័ន្ធ ប្រពលវប្បកម្មដំណាំស្រូវ	១១
ក- គោលការណ៍របស់ ប.វ.ស	១១
ខ- បច្ចេកទេសនៃប្រព័ន្ធប្រពលវប្បកម្ម ដំណាំស្រូវ	១២
គ- ភាពខុសគ្នារវាងផលិតកម្មដំណាំស្រូវ តាមទំលាប់ និងតាម ប.វ.ស	១៤

១៥០.០០០ គ្រួសារ លើភូមិចំនួនប្រមាណ ៥,១៨១ភូមិ នៅក្នុង ២៤រាជធានី ខេត្ត ដោយទទួលទិន្នផលជាមធ្យម ចំនួន ៣.៩០តោន ក្នុង១ហិកតា ខណៈដែលទិន្នផលជា មធ្យមស្រូវវស្សាឆ្នាំ ២០១១ ទទួលបានតែ ២.៩២តោន ក្នុង ១ហិកតាប៉ុណ្ណោះ ។

២- ដំណាក់កាលលូតលាស់របស់ដំណាំស្រូវ

ការយល់ដឹងពីដំណាក់កាលលូតលាស់របស់ដំណាំ ស្រូវមានសារៈសំខាន់ណាស់ ព្រោះធ្វើឲ្យកសិករអាចគ្រប់ គ្រងដំណាំស្រូវរបស់គាត់បានត្រឹមត្រូវ តាមលក្ខណៈ បច្ចេកទេស និងអាចជៀសវាងបាននូវការបាត់បង់ទិន្នផល ដោយសារកត្តាចង្រៃផ្សេងៗទៀត។

ការលូតលាស់ដំណាំស្រូវ ត្រូវបានចែកចេញជា៣វគ្គ សំខាន់ៗគឺ៖


ក- វគ្គលូតលាស់

រយៈពេលនៃវគ្គលូតលាស់របស់ដំណាំស្រូវ អាស្រ័យ ទៅនឹងប្រភេទស្រូវ (ប្រកាន់រដូវ ឬ មិនប្រកាន់រដូវ) និង អាយុកាលនៃពូជនីមួយៗ។

វគ្គលូតលាស់របស់ដំណាំស្រូវចែកចេញជា៤ដំណាក់ កាលគឺ៖

- ដំណាក់កាលដុះពន្លក (ចាប់ផ្តើមពីគ្រាប់ស្រូវ ដល់ ស្រូវដុះពន្លកស្លឹកទីមួយ)
- ដំណាក់កាលសំណាប (ចាប់ពីស្រូវដុះស្លឹកទីមួយ ដល់ស្រូវចាប់ផ្តើមបែកគុម្ព)

- ដំណាក់កាលបែកគុម្ព (ចាប់ពីស្រូវបែកគុម្ពដំបូង ដល់ស្រូវបែកគុម្ពពេញទំហឹង) និង
- ដំណាក់កាលពន្លត់ដើម (ចាប់ពីស្រូវបែកគុម្ពពេញ ទំហឹងដល់ស្រូវចាប់ ផ្តើមពន្លត់កកកួរ)។




នៅក្នុងវគ្គលូតលាស់នេះ អ្នកត្រូវគិតពីការរៀបចំពូជ ការពិនិត្យ គុណភាពគ្រាប់ពូជ ការត្រាំនិងបណ្តុះគ្រាប់ពូជ ការជ្រើសរើសនិង រៀបចំទីកន្លែងសំរាប់សាប ការថែទាំ សំណាប ការរៀបចំដីសំរាប់ស្ទូង ការដាក់ដី និងការថែទាំ សន្ទូង។

ខ- វគ្គបង្កើតផល៖

វគ្គបង្កើតផលមានរយៈពេល ៣៥ថ្ងៃ ដោយគិតពី ស្រូវចាប់ផ្តើមពន្លត់កកកួររហូតដល់ចេញផ្កា ។ ក្នុងវគ្គបង្កើត ផលនេះចាំបាច់ត្រូវថែទាំទឹកឲ្យបានល្អ បាចដីបំប៉ន និង កំចាត់សត្វល្អិតចង្រៃនិងកណ្តុរ។

វគ្គបង្កើតផលចែកជា ៣ ដំណាក់កាលគឺ:

- ដំណាក់កាលពន្លកកក (ចាប់ផ្តើមពីស្រូវពន្លកកក ដល់ស្រូវផើម)
- ដំណាក់កាលចេញកូរ (ចាប់ពីស្រូវផើមដល់ស្រូវចេញកូរផុតពីស្លឹកទង់ជ័យ) និង
- ដំណាក់កាលចេញផ្កា (ចាប់ពីស្រូវចេញកូរផុតដល់ស្រូវរោយលំអង) ។



ក- វគ្គទុំ:

វគ្គទុំមានរយៈពេល ៣០ថ្ងៃ ដោយគិតចាប់ពីស្រូវដាក់ទឹកដោះ រហូតដល់ពេលស្រូវទុំពេញលេញ ។

វគ្គទុំចែកចេញជា ៣ដំណាក់កាលគឺ:

- ដំណាក់កាលដាក់ទឹកដោះ:
- ដំណាក់កាលដាក់ម្សៅ និង
- ដំណាក់កាលទុំពេញលេញ។

នៅក្នុងវគ្គទុំនេះ អ្នកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នលើបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការបំផ្លាញរបស់ ស្រីង កណ្តុរ ចាប និងពេលវេលានៃការប្រមូលផល។

៣-គោលការណ៍ និងបច្ចេកទេសរបស់ប្រព័ន្ធប្រពលវប្បកម្មដំណាំស្រូវ

ក- គោលការណ៍របស់ ប.វ.ស:

- ដំណាំស្រូវមិនមែនជារុក្ខជាតិទឹក ប៉ុន្តែវាធន់ទ្រាំទៅនឹងទឹក ។ ប្រសិនបើដំណាំស្រូវដុះក្នុងទឹកតិចៗនោះ សក្តានុពលនៃការលូតលាស់និងការបែកគុម្ពរបស់វាបានល្អ
- ដំណាំស្រូវ នឹងកាត់បន្ថយសក្តានុពលធម្មជាតិក្នុងការបែកគុម្ព ប្រសិនបើអ្នកស្ទង់សំណាប មានអាយុលើសពី ១៥ថ្ងៃឡើងទៅ
- ដំណាំស្រូវនឹងមានសក្តានុពលបែកគុម្ពខ្ពស់ ប្រសិនបើអ្នកកាត់បន្ថយនូវភាពរន្ធត់របស់វា (ឧទាហរណ៍: ការដកសំណាបពីថ្នាល រួចយកមកបោកនឹងប្រអប់ជើងអ្នកខ្លាំងៗ បន្ទាប់មកយកវាមកចងរឹតជាកណ្តាប់ជាដើម ។ល។)
- ប្រសិនបើដំណាំស្រូវដុះតែឯងនោះ វានឹងលូតលាស់ហើយបែកគុម្ពតាមសក្តានុពលធម្មជាតិរបស់វា
- ដំណាំស្រូវនឹងលូតលាស់បានល្អ ប្រសិនបើដីធ្លីមានខ្យល់ចេញ ចូល និងមានដីជាតិគ្រប់គ្រាន់។

ខ- បច្ចេកទេសនៃប្រព័ន្ធប្រពលរបៀបកម្មដំណាំស្រូវ:

បច្ចេកទេសសំខាន់ៗចំនួន១២ នៃប្រព័ន្ធប្រពល
របៀបកម្មដំណាំស្រូវ ដើម្បីឲ្យស្រូវផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់គឺ:


- ប្រើដីធម្មជាតិ ជាពិសេសជីកំប៉ុស្ត ដើម្បីឲ្យ
ដីផុសល្អ
- ប្រើពូជសុទ្ធល្អ និងរើសតែគ្រាប់ពេញល្អសំរាប់
យកទៅសាប
- ធ្វើថ្នាលសំណាបគោក ហើយសាបស្តើង ដើម្បីឲ្យ
សំណាបថ្លោសល្អ
- ដកថ្មមៗ យកតែសំណាបណាថ្លោសៗ រួចយក
ទៅស្ទង់ភ្លាមៗ
- ស្ទង់សំណាបអាយុខ្ចី យកល្អអាយុត្រូវតិចជាង
១៥ថ្ងៃ
- ស្ទង់ចាប់ស្តើង យកល្អស្ទង់តែ១ដើមក្នុង១គុម្ព
- ស្ទង់ថ្មមៗ រាក់ៗ និងកុំបតឬសដូចផ្លែសន្ធឹច
- ស្ទង់ជាជួរដោយចំងាយពីគុម្ពមួយទៅគុម្ពមួយស្មើៗគ្នា
- ស្ទង់ឲ្យឆ្អើលពីគ្នា ដោយទុកចន្លោះពី ២-៤តីក
- ជៀសវាងមានទឹកដក់ច្រើននៅក្នុងស្រែ ពេលស្រូវ
កំពុងលូតលាស់
- ដកស្មៅនិងបំផុសដីឲ្យបាន២-៤ដង ដើម្បីឲ្យខ្យល់
ចេញចូលល្អ និង
- ធ្វើដីឲ្យបានរាបស្មើ និងមានប្រព័ន្ធសម្រាប់
បញ្ចេញទឹក។



គ- ភាពខុសគ្នារវាងផលិតកម្មដំណាំស្រូវតាមទំលាប់ និងតាម ប.វ.ស:

តាមទំលាប់	តាម ប.វ.ស
- មិនបានជ្រើសរើសពូជសុទ្ធផល និងគ្រាប់ពេញទៅសាប - រក្សាទឹកទុកច្រើននៅក្នុងថ្នាលសំណាប និងសាបក្រាស់ដែលនាំឲ្យសំណាបមានដើមតូច ឬរាវ - ស្ទូងចាប់ធំ ដោយលាយឡំគ្នារវាងសំណាបដែលអន់និងដើមល្អិត - ស្ទូងសំណាបអាយុចាស់ ជាទូទៅលុះត្រាសំណាបអាយុលើសពី ១ខែ ទើបយកទៅស្ទូង - ដកសំណាបបោកទៅនឹងប្រអប់ជើង ដែលបណ្តាលឲ្យបាក់ដើម និងដាច់ឬសស្រូវ រួចយកមកចងរឹតជាកណ្តាប់ និងផ្គាប់ទុក ១-២ យប់មុនយកទៅស្ទូង - ស្ទូងញឹក និងមិនស្មើគ្នារវាងចន្លោះគុម្ពមួយទៅគុម្ពមួយ (ស្ទូងជាមុំចង្រ្កាន)	- ជ្រើសរើសពូជសុទ្ធផល និងគ្រាប់ពេញទៅសាប - រៀបចំថ្នាលសំណាបគោកដូចរងស្តែ ហើយសាបស្តើង (ពូជ០,៥គ.ក្រលើផ្ទៃដី៥ម៉ែត្រក្រឡា) ដើម្បីឲ្យដើមសំណាបថ្លោសល្អ - ដកយកតែសំណាបដែលថ្លោសៗយកទៅស្ទូងហើយស្ទូងតែ១-២ដើមប៉ុណ្ណោះក្នុង១គុម្ព - ស្ទូងសំណាបខ្លីអាយុតិចជាង ១៥ថ្ងៃ - ដកថ្មមៗ មិនឲ្យបាក់ដើម និងដាច់ឬសរួចដាក់ក្នុងកាធុនឬបង្គី(មិនបោក)។ ដកភ្លាមស្ទូងភ្លាម និងស្ទូងរាក់ៗ - ស្ទូងជាជួរ ចន្លោះគុម្ពពី ២០-៤០សង់ទីម៉ែត្រ ទៅតាមស្ថានភាពដីជាតិដី។

តាមទំលាប់	តាម ប.វ.ស
- រក្សាទឹកទុកក្នុងស្រែជានិច្ចក្នុងអំឡុងពេលស្ទូងនិងស្រូវកំពុងលូតលាស់ - ដកស្មៅមិនទាន់ពេលវេលា មិនបានញឹកញាប់ និងមិនទៀងទាត់ - មិនប្រើប្រាស់កំទេចកំទីសំរាមជុំវិញផ្ទះ តែអាស្រ័យទាំងស្រុងទៅលើការប្រើប្រាស់ដីគីមី - មិនយកចិត្តទុកដាក់បន្សុទ្ធពូជមុនពេលច្រូតកាត់សំរាប់ទុកធ្វើជាគ្រាប់ពូជ។	- រក្សាទឹកទុកតិចៗក្នុងស្រែ យកល្អរក្សាដីស្រែគ្រាន់តែសើម ឬម្តងស្អាតម្តងសើម - ដកស្មៅបានទាន់ពេលវេលា ញឹកញាប់ និងជាទៀងទាត់ - ប្រើប្រាស់ដីធម្មជាតិ ជាពិសេសជីកំប៉ុស្តគោក និងជីកំប៉ុស្តទឹកបំប៉ន - ធ្វើការបន្សុទ្ធពូជមុនពេលច្រូតកាត់ និងរក្សាទុកឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។




៤- ការណែនាំបន្ថែមពីបច្ចេកទេសមួយចំនួនរបស់ ប្រព័ន្ធប្រពលវប្បកម្មដំណាំស្រូវ

ក- ការជ្រើសរើសគ្រាប់ពូជ:

ការជ្រើសរើស និងសំរាំងគ្រាប់ពូជស្រូវដែលល្អសំរាប់ធ្វើការដាំដុះ ក្នុងស្រែរបស់អ្នកមានសារៈសំខាន់ណាស់ ព្រោះគ្រាប់ពូជល្អអាចដុះលូតលាស់បានឆាប់រហ័ស និងផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់។ ក្នុងន័យនេះ អ្នកគប្បីពិចារណាទៅលើលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួនរបស់ដំណាំស្រូវ ដែលអ្នកត្រូវជ្រើសរើសយកមកដាំដូចជា:

- ពូជផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់
- គ្រាប់ពូជសុទ្ធដែលមានគុណភាព (ដំណុះគ្រាប់ពី៨៥%ឡើងទៅ)
- រយៈពេលលូតលាស់ (ស្រូវស្រាល ឬស្រូវកណ្តាល)
- ភាពធន់ទ្រាំនឹងការរាំងស្ងួត សត្វល្អិតចង្រៃនិងជំងឺ
- គុណភាពគ្រាប់អង្ករ និងរសជាតិ



ខ- ការជ្រើសរើស និងការរៀបចំទីកន្លែងសំរាប់សាបៈ

ត្រូវជ្រើសរើសទីកន្លែង សំរាប់ធ្វើថ្នាលសំណាបឲ្យបានល្អប្រសើរបំផុត ។ កន្លែងដែលជ្រើសរើសនោះត្រូវ៖

- ងាយស្រួលក្នុងការបញ្ចេញទឹក
- ងាយស្រួលការពារសត្វពាហនៈ និងបក្សី
- ដីថ្នាលត្រូវមានជីជាតិល្អ
- ស្ថិតនៅឆ្ងាយពីម្លប់រុក្ខជាតិ។

ដើម្បីស្ទង់នៅលើផ្ទៃដី១ហិកតា អ្នកត្រូវមានផ្ទៃដីសំរាប់ធ្វើជាថ្នាលសំណាបពី១៥០-២០០ម៉ែត្រក្រឡា។ អ្នកត្រូវដាក់ជីធម្មជាតិ បន្ទាប់មកត្រូវវាស់ឲ្យបានហ្មត់ចត់ល្អ ហើយលើករងជាថ្នាលតូចៗដូច រងស្តែដែលមានទទឹងពី ១,៥-២ម៉ែត្រ ឯបណ្តោយអាស្រ័យទៅតាម ទំហំដីស្រែរបស់អ្នក។ ការធ្វើថ្នាលសំណាបជារងធ្វើឲ្យងាយស្រួល ក្នុងការសាបការស្រោចទឹក ឬបញ្ចេញទឹក ការបោចស្មៅនិង ការកំចាត់សត្វល្អិតចង្រៃ។

គ- ការប្រើប្រាស់ដីលើថ្នាលសំណាបៈ


អ្នកគប្បីភ្ជួរដីឲ្យសព្វល្អក្នុងជម្រៅប្រមាណ១៥សង់ទីម៉ែត្រ (ជិតមួយចម្អាម) និងហាលឲ្យបានពី ៧-១០ថ្ងៃ មុនពេលរៀបចំវាធ្វើជាថ្នាលសំណាប។ ត្រូវប្រើដីលាមកសត្វ ឬដីកំប៉ុស្តដែលរលួយល្អ សំរាប់ទ្រាប់បាតថ្នាលសំណាប។ អ្នកអាចប្រើប្រាស់ដីលាមកសត្វ ឬដីកំប៉ុស្តចំនួន១-២រទេះគោសំរាប់ផ្ទៃដី១០០ម៉ែត្រក្រឡា រួចវាស់លប់បំបែកឲ្យសព្វ និងកៀរវាឲ្យស្មើល្អ។

ឃ- ការសំអាតគ្រាប់ពូជ

សំអាតគ្រាប់ពូជឲ្យបានស្អាតល្អមុនពេលយកទៅត្រាំ និងបណ្តុះជាការចាំបាច់ណាស់ ពីព្រោះគ្រាប់ពូជដែលអ្នកមិនបានសំអាតវា អាចមានលាយសំដី ឬគ្រាប់មិនពេញទឹក (ស្លៀត) ដែលជាហេតុនាំឲ្យសំណាបដុះមិនល្អ។ ដូចនេះអ្នកគប្បីធ្វើការសំអាត និងយកតែគ្រាប់ដែលពេញល្អយកទៅសាប។ គ្រាប់ពេញល្អធ្វើឲ្យសំណាបដុះថ្លោសល្អ និងមានកំលាំងខ្លាំង ពេលអ្នកដកវាយកទៅស្ទង់ សន្ទូងនោះនឹងឆាប់លូតលាស់។

ដើម្បីញែកគ្រាប់ពេញ និងគ្រាប់តូចស្លៀត ឬសំដី ស្រូវចេញពីគ្នាអ្នកត្រូវអនុវត្តតាមលំដាប់លំដោយដូចតទៅ៖

- ដាក់ពងមាន់ ឬពងទាចូលក្នុងធុងទឹក រួចចាក់អំបិលមួយចំនួនចូលទៅក្នុងធុងទឹកនោះ បន្ទាប់មកកូរវាឲ្យរលាយអស់ ។ ប្រសិនបើស្ថិតពុំទាន់អណ្តែតឡើងលើផ្ទៃទឹកទេអ្នកត្រូវចាក់អំបិលបន្ថែម រហូតដល់ស្ថិតនោះអណ្តែតឡើងលើផ្ទៃទឹក
- ចាក់គ្រាប់ពូជដែលត្រូវសាបឲ្យបានពាក់កណ្តាលធុងរួចកូរឲ្យសព្វ
- កៀរយកចេញនូវសំដី និងគ្រាប់ស្រូវណាដែលអណ្តែតប៉ើលប៉ោល
- ស្រង់យកគ្រាប់ដែលលិចក្នុងទឹកទុកមួយកន្លែង ហើយធ្វើដូចនេះសារឡើងវិញរហូតដល់អស់គ្រាប់ពូជដែលត្រូវយកទៅសាប
- គ្រាប់ពូជស្រូវល្អដែលបានស្រង់ទុកនោះត្រូវយកទៅលាងជាមួយទឹក ដើម្បីឲ្យអស់ជាតិអំបិលសិនមុននឹងយកទៅត្រាំបើពុំដូច្នោះទេនោះគ្រាប់ពូជពុំអាចដុះបានឡើយ។



ង- ការត្រាំ និងផ្គាប់គ្រាប់ពូជ:

ការត្រាំ និងផ្គាប់គ្រាប់ពូជ គឺជាដំណើរការចំនួនពីរក្នុងការបណ្តុះគ្រាប់ពូជ។ គ្រាប់ពូជដែលបណ្តុះរួចយកទៅសាបក្នុងថ្នាលពុំសូវមានការបំផ្លាញពីសត្វល្អិត សត្វស្លាប ជំងឺ ស្មៅឬសត្វចង្រៃផ្សេងៗទេ ពីព្រោះវាដុះលូតលាស់ឆាប់រហ័ស។ អ្នកត្រូវគិតគូរឲ្យបានច្បាស់អំពីបរិមាណ និងគុណភាពគ្រាប់ពូជមុននឹងយកមកត្រាំដើម្បីសាប។ គ្រាប់ពូជដែលមានគុណភាពល្អត្រូវមានដំណុះពី ៨៥%ឡើងទៅ។ ដើម្បីយល់ដឹងពីគុណភាពគ្រាប់ យើងត្រូវយកគ្រាប់ពូជ១០០គ្រាប់មកតំរៀបលើបន្ទះក្រណាត់មួយរួចរុំវាឲ្យជាប់ បន្ទាប់មកត្រូវត្រាំក្នុងទឹករយៈពេល២៤ម៉ោង សំដីលវា ដោយរក្សាសំណើម និងកំដៅរយៈពេល៤៨ម៉ោង រួចហើយយើងលាត្រណាត់រាប់នូវគ្រាប់ដែលដុះ (ចាប់ពី១សង់ទីម៉ែត្រ ឡើងទៅ) តើមានចំនួនប៉ុន្មាន? ចំនួនដែលបានមកនេះ គឺជាភាគរយ នៃដំណុះគ្រាប់ពូជ។ សំរាប់ផ្ទៃដី១ហិកតា ត្រូវការគ្រាប់ពូជមានគុណភាពល្អពី ១០-១៥គីឡូក្រាម។ បើគុណភាពដំណុះតិចជាង ៨៥% ត្រូវបន្ថែមគ្រាប់ពូជ (ឬប្តូរពូជផ្សេង)

ដើម្បីឲ្យមានសំណាបគ្រប់គ្រាន់សំរាប់ស្លុង ។ មុនត្រាំត្រូវលាងគ្រាប់ពូជឲ្យបានស្អាត រួចច្រកទៅក្នុងបារដោយចងមាត់ កុំឲ្យតឹងពេកហើយត្រាំក្នុងទឹកស្អាតរយៈពេល២៤ម៉ោង។ បន្ទាប់មកត្រូវលាងគ្រាប់ដែលត្រាំរួចឲ្យស្អាតហើយយកវាទៅដាក់ក្នុងម្លប់ ដោយពង្រាបបារស្រូវឲ្យមានកំរាស់ពី១០-១៥សង់ទីម៉ែត្រ និងយកចំបើងគ្របពីលើបារដើម្បីបង្កើនកំដៅដែលជួយជំរុញឲ្យគ្រាប់ពូជដុះបានល្អ។ ត្រូវលើកត្រឡប់បារគ្រាប់ពូជពីលើចុះមកក្រោម រយៈពេល១២ម៉ោង រួចស្រោចទឹកផ្សើមតិចៗ។




ច- ការសាប:

អ្នកត្រូវសាបគ្រាប់ពូជឲ្យស្មើល្អ គឺក្នុងកម្រិត១០០ក្រាមក្នុង១ម៉ែត្រក្រឡា ដោយប៉ាន់ស្មានក្នុងកំរិត ១ទូកដៃ។ ការសាបញឹក ឬ ក្រាស់ពេកបណ្តាលឲ្យដើមសំណាបតូចឆ្មារហើយទន់ខ្សោយ។ ការសាបគួរធ្វើនៅពេលល្ងាចដើម្បីជៀសវាងការស្ងួតឬសដោយសារ កំដៅថ្ងៃហើយបើជឿជាក់ថា មានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបន្ទាប់ពីសាប អ្នកគួរពន្យារពេលរហូតដល់ភ្លៀងរួច ដើម្បីកុំឲ្យគ្រាប់រមួរចូលគ្នា ឬហូរចូលក្នុងចង្កូរវង។

ឆ- ការរៀបចំដី:

ការរៀបចំដីមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំង ទៅលើការដុះ លូតលាស់របស់ដំណាំស្រូវ។ បើអ្នករៀបចំដីបានល្អនោះ ដំណាំស្រូវនឹងលូតលាស់បានល្អដែរ។ ត្រូវលើកភ្លឺស្រែឲ្យ បានមាំល្អដើម្បីថែរក្សាទឹក និងជីជាតិមិនឲ្យហូរចេញពីស្រែ របស់អ្នក។ ត្រូវភ្ជួររាស់ដីស្រែឲ្យបានច្រើនសារ និងមាន ជម្រៅយ៉ាងតិច១៥សង់ទីម៉ែត្រ ហើយរាស់ពង្រាបឲ្យបាន ស្មើល្អដើម្បី:

- កប់បញ្ចូលស្មៅ និងកាកសំណល់រុក្ខជាតិផ្សេងៗ ទៅក្នុងដីឲ្យ រលួយក្លាយជាជីសំរាប់ដំណាំស្រូវ
- ឲ្យដីជួរស្រួលស្អាត និងឲ្យប្រព័ន្ធឫសស្រូវលូតលាស់ បានល្អ
- ងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងទឹក
- លាយច្របល់ ឬកប់បញ្ចូលដីធម្មជាតិទៅក្នុងដី ដើម្បីបន្ថយការ វាយធាតុចិញ្ចឹម (អាស៊ីត) ទៅក្នុង ខ្យល់ និង
- បង្កើនរន្ធខ្យល់ក្នុងដី




ចំពោះដីស្រែប្រាំងឬស្រែប្រដេញទឹក អ្នកត្រូវភ្ជួររាស់ដី ចោលមុនពេលទឹកលិចព្រោះវាជួយកំចាត់ស្មៅ បង្កើនជីជាតិ ដី និងងាយស្រួលរៀបចំដីក្រោយពេលទឹកស្រក ដោយគ្រាន់ តែរាស់ពង្រាបឲ្យស្មើល្អជាការស្រេច។

ឆ- ការប្រើប្រាស់ដី:

អ្នកគប្បីយកចិត្តទុកដាក់ លើការប្រើប្រាស់ដី ធម្មជាតិឲ្យបានច្រើនបំផុត ព្រោះដីធម្មជាតិមានគុណសម្បត្តិ ច្រើនដូចជា:

- ធ្វើឲ្យដីផុសល្អ
- អាចរក្សាសំណើមក្នុងដីបានយូរ
- ជួយបង្កើនជីជាតិដី
- ជួយបង្កើនវត្ថុមាននិងសកម្មភាពអតិសុខុមប្រាណ (មីក្រូសរីរាង្គ) មានប្រយោជន៍នៅក្នុងដី
- បន្ថយការចំណាយក្នុងការទិញជីគីមី និង
- ជួយរក្សាបរិស្ថានបានល្អ។



ដីធម្មជាតិដែលត្រូវប្រើប្រាស់នោះមាន៖ ដីលាមកសត្វ ដីកំប៉ុស្ត និងដីស្រស់ (ពួកអំបូរសណ្តែក ស្មៅ ចកអាសូឡា ...) ។ ម្យ៉ាងទៀត ចំហើងនិងជញ្ជាំងស្រូវក៏ផ្តល់ដីជាតិសំខាន់ សំរាប់ដីស្រែដែរ ដូចនេះគប្បីភ្ជួរលប់ឲ្យបានល្អ ដោយមិនត្រូវ ដុតវាចោលឡើយ។ គប្បីប្រើប្រាស់ដីលាមកសត្វ និង ដីកំប៉ុស្ត ដែលរលួយល្អទ្រាប់បាត ក្នុងកម្រិតពី១០-២០តោន ក្នុង១ហិកតា ហើយភ្ជួរលប់នៅពេលភ្ជួរចុងក្រោយបង្អស់។ ចំពោះដីស្រស់ និងកាកសំណល់រុក្ខជាតិផ្សេងៗ ត្រូវភ្ជួរលប់ មុនថ្ងៃស្អែកពី១០-១៥ថ្ងៃ ដើម្បីឲ្យរុក្ខជាតិទាំងនោះ រលួយ បានល្អ។

ឈ- ការគ្រប់គ្រងទឹក៖

ការគ្រប់គ្រងទឹកបានត្រឹមត្រូវល្អ ធ្វើឲ្យដំណាំស្រូវដុះ លូតលាស់បានល្អ ហើយអាចកាត់បន្ថយនូវការខូចខាត ទិន្នផលដែលបណ្តាលមកពីការរាំងស្ងួត។ ដូចនេះសំរាប់ កន្លែងដែលមានភ្លៀងពុំសូវទៀងទាត់ ហើយឆាប់រីងស្ងួត អ្នកគប្បីគិតគូរលើកត្តាសំខាន់ៗខ្លះដូចជា៖

- ថែទាំភ្លឺស្រែឲ្យបានល្អ តែកុំរក្សាទុកទឹកច្រើនពេក នៅពេលដំណាំស្រូវកំពុងស្ថិតនៅក្នុងវគ្គលូតលាស់ ជាពិសេសដំណាក់កាលបែកគុម្ព
- កំចាត់ស្មៅចង្រៃឲ្យអស់ពីស្រែ ព្រោះស្មៅភាគច្រើន ស្រូបយកទឹក និងដីជាតិពីដីស្រែខ្លាំងជាងដំណាំស្រូវ
- ប្រសិនបើធ្វើទៅបាន គួរដឹកស្រះក្នុងស្រែទំហំ ២០ម៉ែត្រx១០ម៉ែត្រ ដើម្បីផ្ទុកទឹកសម្រាប់ស្រោច ស្រពពេលជួបប្រទះនូវការ រាំងស្ងួត និងអាចប្រើ សំរាប់ចិញ្ចឹមត្រីផង។

ក្រោយពេលស្ទឹងរួច អ្នកត្រូវថែរក្សាទឹកក្នុងស្រែឲ្យ មានជម្រៅមិនលើសពី២-៣សង់ទីម៉ែត្រ ឬម្តងស្ងួតម្តងសើម ឬគ្រាន់តែសើមតិចៗបានហើយ។ ការថែរក្សាទឹកក្នុងស្រែ នេះធ្វើឡើងដើម្បី៖

- * បង្ក្រាបការលូតលាស់របស់ស្មៅ
- * ជួយដល់ដំណាំស្រូវក្នុងការស្រូបយកដីជាតិពីដី
- * ជួយរំលាយសារធាតុសរីរាង្គ
- * ធ្វើឲ្យដំណាំស្រូវអាចបែកគុម្ពបានច្រើន។

ចំណាំ៖ សំណាបដែលស្ទឹងរួចអាចងាប់កាលណាស្រែអ្នកស្ងួត ហែងឬមានទឹកច្រើនពេក។ គួររក្សាទឹកក្នុងស្រែឲ្យបានគ្រប់ គ្រាន់ក្នុងពេលដែលស្រូវស្ថិតក្នុងវគ្គបង្កើតផល (ដើម-ដាក់ ទឹកដោះ) ព្រោះភាពស្ងួតហែងក្នុងវគ្គនេះធ្វើឲ្យស្រូវស្តុក ឬ ដាក់គ្រាប់មិនពេញ។

ញ- ការកំចាត់ស្មៅ និងការបាចជីបំប៉ន៖

ត្រូវដកស្មៅចង្រៃ ដែលដុះលាយជាមួយដំណាំស្រូវ ឲ្យបានស្អាត ព្រោះស្មៅអាចប្រពែងដណ្តើមយកសារធាតុ ចិញ្ចឹម សំណើម និងពន្លឺពីដំណាំស្រូវរបស់អ្នក លើសពីនេះ ទៀតវាជាជំរកសំរាប់សត្វល្អិតចង្រៃ និងកណ្តុរ។ អ្នកអាច បាចជីបំប៉នបន្ថែមទៀត ជាពិសេសដីកំប៉ុស្តដែលរលួយល្អ នៅពេលស្រូវបែកគុម្ព ដើម្បីបង្កើនការបែកគុម្ពរបស់វាឲ្យ បានជាអតិបរមា និងបាចម្តងទៀតនៅពេលស្រូវចាប់ផ្តើម ពន្លកកករ ដើម្បីឲ្យ ស្រូវមានកូរធំហើយវែងល្អ។



៥-ការប្រមូលទុកដាក់ផលស្រូវ

ក- ការប្រមូលផល:

បញ្ហាសំខាន់នៃការប្រមូលផល គឺការត្រួតកាត់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលា ដើម្បីជៀសវាងនូវការបាត់បង់ទិន្នផល។ មុនធ្វើការត្រួតកាត់សំខាន់បំផុត គឺត្រូវវិនិច្ឆ័យលើភាពទុំរបស់ស្រូវឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ពេលវេលាសមស្របសំរាប់ការត្រួតកាត់ គឺនៅពេលដែលគ្រាប់ស្រូវ ៨០-៨៥% នៅចុងកូរមានពណ៌ លឿងដូចចំបើងហើយគ្រាប់នៅគល់កូរស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលម្សៅខ្លាំង។ ការត្រួតកាត់បានទាន់ពេលវេលានេះអាចធ្វើឲ្យ :

- គុណភាពអង្ករល្អ មានតំលៃខ្ពស់នៅទីផ្សារ
- មិនសូវបាត់បង់ទិន្នផល ដែលបណ្តាលមកពីការដួលដើម បាក់កូរ ជ្រុះគ្រាប់ ឬការបំផ្លាញរបស់ចាប និងកណ្តុរ។



ខ- ការទុកដាក់ផលស្រូវ:

គ្រាប់ស្រូវដែលទើបត្រួតកាត់បោកបែនរួចវាអាចមានសំណើមគ្រាប់ពី ១៨-២៥% ។ អ្នកមិនអាចយកគ្រាប់ស្រូវដែលមានសំណើមខ្ពស់បែបនេះទៅស្តុកបានទេ ព្រោះគ្រាប់ស្រូវនោះ នឹងត្រូវពុកផុយដោយសារពូកផ្សិត និងមានសត្វល្អិតចង្រៃបំផ្លាញច្រើន។ ដូចនេះមុនពេលស្តុកត្រូវហាលគ្រាប់ស្រូវក្រោមកំដៅថ្ងៃរយៈពេល២-៣ថ្ងៃ ឲ្យបានស្ងួតល្អសិន ។ គ្រាប់ស្រូវដែលអាចស្តុកទុកបាន ត្រូវមានសំណើមប្រមាណ១៤%។ អ្នកអាចដឹងពីភាពស្ងួតរបស់គ្រាប់ស្រូវ

បានដោយខំគ្រាប់ជាពីរកំណាត់ ហើយពិនិត្យមើល បើផ្នែកខាងក្នុងគ្រាប់មានពណ៌សថ្លានោះ គ្រាប់ស្រូវស្អាតល្អម តែបើវាមិនមានពណ៌សថ្លាទេនោះ គ្រាប់ស្រូវមិនទាន់ស្អាតនៅឡើយទេ។

ចូរកុំហាលគ្រាប់ស្រូវឲ្យស្អាតពេក ព្រោះវានឹងបណ្តាលឲ្យប្រេះគ្រាប់ និងបាក់គ្រាប់ច្រើននៅពេលអ្នកកិនវា។ ជង្រុកសំរាប់ដាក់ស្រូវត្រូវស្ថិតនៅកន្លែងដែលស្ងួត មានខ្យល់ចេញចូលល្អ និងគ្មានកណ្តុរបំផ្លាញ។ បើមានពូជស្រូវផ្សេងៗពីគ្នាច្រើននោះអ្នកត្រូវដាក់វាដោយឡែកពីគ្នា ហើយដាក់ផ្លាកឈ្មោះពូជឲ្យបានច្បាស់លាស់ ធ្វើដូចនេះដើម្បីកុំឲ្យពូជរបស់អ្នកលាយចូលគ្នា។



៦- ការកត់ត្រាការចំណាយ និងចំណូលនៃការដាំដុះស្រូវ

ការកត់ត្រាបានច្បាស់លាស់លើការចំណាយ និងចំណូលពីការដាំស្រូវឬផលិតកម្មអ្វីផ្សេងទៀត មានសារៈសំខាន់ណាស់សំរាប់កសិករគ្រប់រូប ព្រោះធ្វើឲ្យគាត់យល់ដឹងច្បាស់ពីការចំណេញ ឬខាតក្នុងការធ្វើផលិតកម្ម និងចេះជ្រើសរើសនូវវិធីសាស្ត្រល្អៗ សំរាប់យកមកអនុវត្តក្នុងផលិតកម្មរបស់គាត់ ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណេញច្រើន។

៧- ចំណេះដឹងទូទៅអំពីស្ថានភាពស្បៀងប្រចាំឆ្នាំ

ប្រសិនបើអ្នកចង់ដឹងជាមុន អំពីស្ថានភាពតុល្យភាពស្បៀងប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងស្រុកឬសហគមន៍របស់អ្នកនោះ អ្នកគប្បីយល់ដឹងពីមេគុណ (Coefficient) និងរបៀបគណនាតាមលំដាប់ដោយដូចខាងក្រោម៖

- អ្នកត្រូវកាត់ ១៣% (៤% សំរាប់ទុកពូជ ២% សំរាប់ចំណីសត្វ និង ៧% សំរាប់ការបាត់បង់ក្រោយពេល ប្រមូលផល) ចេញពីបរិមាណផលស្រូវសរុបដែលមាននៅក្នុងស្រុក ឬសហគមន៍របស់អ្នក ។
- ស្បៀងដែលមានសរុបគិតជាអង្ករដែលមាននៅក្នុងស្រុក ឬ សហគមន៍របស់អ្នកនោះ គឺស្មើនឹងបរិមាណផលស្រូវសរុប ដែលនៅសល់ពីការកាត់ចេញ១៣% ខាងលើយកមកគុណ នឹង ៦៤% ។
- តម្រូវការស្បៀងគិតជាអង្ករសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុង ១ឆ្នាំ គឺ ១៤៣ គីឡូក្រាម ។

ឧទាហរណ៍:

នៅក្នុងស្រុកឬសហគមន៍ អ្នកមានពលរដ្ឋចំនួន ១០.០០០ នាក់ ហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះស្រុក ឬសហគមន៍ ផលិតបានបរិមាណផលស្រូវសរុបចំនួន ៥.០០០តោន ដូចនេះ អ្នកអាចគណនារកតុល្យភាពស្បៀងប្រចាំឆ្នាំ របស់ ស្រុក ឬសហគមន៍តាមរបៀបដូចខាងក្រោម:

$$* \text{កាត់ទុក } ១៣\% : \frac{៥.០០០ \text{តោន} \times ១៣}{១០០} = ៦៥០ \text{តោនស្រូវ}$$

$$* \text{ស្បៀងគិតជាអង្ករ} : \frac{(៥.០០០ \text{តោន} - ៦៥០ \text{តោន}) \times ៦៤}{១០០} = ២.៧៨៤ \text{តោនអង្ករ}$$

$$* \text{តម្រូវការស្បៀង១ឆ្នាំ} = ១៤៣៣ \text{គីឡូក្រាម} \times ១០.០០០ \text{នាក់} = ១.៤៣០.០០០ \text{គីឡូក្រាម ឬ } ១.៣៥៤ \text{តោនអង្ករ}$$

$$* \text{តុល្យភាពស្បៀង} + ២.៧៨៤ \text{តោន} - ១.៤៣០ \text{តោន} = ១.៣៥៤ \text{តោន}$$

ដូច្នេះអ្នកដឹងថានៅក្នុងស្រុកឬសហគមន៍របស់អ្នក ក្នុងឆ្នាំនេះមានស្បៀងគិតជាអង្ករ ដែលនៅសល់ក្រោយពី ការដកទុក សំរាប់ហូប សំរាប់ចិញ្ចឹមសត្វ សំរាប់ពូជ និង សំរាប់ការខាតបង់ផ្សេងៗ មាន ចំនួន ១.៣៥៤ តោន។

ប្រសិនបើតុល្យភាពស្បៀងមាន សញ្ញាជក (-) នៅ ពីមុខគួរលេខនោះមានន័យថាស្រុក ឬសហគមន៍អ្នកមាន ការខ្វះខាតស្បៀង។



ឯកសារយោង

- ១- ក្រសួងកសិកម្មជំរុញការប្តូរពូជ និងបច្ចេកទេសថ្មីដល់ កសិករ (២០០៥)
- ២- យ៉ុង សាំងកុមារ - មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សា និងអភិវឌ្ឍន៍ កសិកម្មកម្ពុជា (CEDAC) (២០០៥) - ប្រព័ន្ធប្រពល វប្បកម្មដំណាំស្រូវតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិ
- 3- JICA 2001 - The Study on Improvement of Marketing System and Post-Harvest Quality Control of Rice in Cambodia.
- ៤- អង្គការស៊ីដសេកម្ពុជា (១៩៩៦) - ផលិតកម្មដំណាំស្រូវ
- ៥- ផលិតកម្មដំណាំស្រូវ (IRRI)
- ៦- សៀវភៅអនុវត្តជាក់ស្តែង អំពីដំណាំស្រូវ (IRRI)
- ៧- នាយកដ្ឋានក្សេត្រសាស្ត្រ + ស៊ីដសេ (១៩៩០) ផលិតកម្មដំណាំស្រូវដែលធានាបានផលច្រើន។



កំណត់ចំណាំ



សេដ្ឋកិច្ចកៅណែនាំនេះជាអំណោយមេស
 ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ប៊ុន ហ៊ុន សែន រដ្ឋមន្ត្រី
 ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងលោកជំទាវ
 ឆោរកុម្មុលីភី ៦ ចំនួន ៥,០០០ គ្បាល