

ដំឡូងដំឡូង



គំរោងគំណនលកម្មវិធី ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ អាស៊ី
(ADB) លេខ 1445-CAM (SF)
នាយកដ្ឋាន ផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម
លេខ : ៣ ឆ្នាំ ២០០៣

១-សារៈសំខាន់របស់ដំឡូងជ្វា

ដំឡូងជ្វាជាដំណាំមើមមួយប្រភេទ ដែលកសិករនិយមដាំនៅ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ មើមរបស់វា គេអាចយកទៅធ្វើអាហារ សំរាប់ជំនួសបាយបាន ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត គេអាចច្នៃ មើមដំឡូងជ្វាធ្វើ ជាបង្កើម ធ្វើជាតំណាប់ ។ល។ ដំឡូងជ្វា ជាដំណាំមួយប្រភេទ ដែល សម្បូរទៅដោយកាបូនអ៊ីដ្រាត ឬ ជាតិម្សៅ និងវីតាមីន "អ" ចំណែក ទង និងស្លឹករបស់វា គេអាចយកទៅធ្វើជា បន្លែ និងចំណីសត្វបាន យ៉ាងល្អ ។

ដំឡូងជ្វា គឺជាអាហារទ្រទ្រង់រាងកាយមួយមុខដ៏សំខាន់ផង ដែរ ។ ព្រោះវាសម្បូរជាតិម្សៅដូចអង្ករដែរ វាអាចជួយជំនួសការខ្វះ ខាតស្បៀងបានម្តងម្កាលដោយការបរិភោគមើមដំឡូងជ្វា ។

២-ប្រភេទពូជ

ដំឡូងជ្វា មានពូជជាច្រើនប្រភេទ គេអាចបែងចែកពូជរបស់វា ទៅតាម ទំរង់ស្លឹក ប្រវែង ដើមពណ៌របស់សំបក និងសាច់មើមដំឡូង ។

ពូជរបស់ដំឡូងជ្វាមានដូចតទៅ :

ក-ពូជឆ្មៅ

ពូជនេះ ស្លឹករបស់វា មានលក្ខណៈឆែកប្រហែលស្លឹកល្អុងខ្មែរ សំបកមើម និងសាច់មានពណ៌លឿងខ្ចី ។



ពូជដំឡូងធ្លា “ ល្បៅ ”

ខ - ពូជហាវែ

មានស្លឹកពណ៌បៃតង
មិនធែកខ្លាំង សំបកពណ៌
ក្រហមភ្លាវ និងសាច់មើម
ពណ៌លឿងខ្ចី ។



ពូជដំឡូងធ្លា “ ប្រយស្សាយ ”



ពូជដំឡូងធ្លា “ ហាវែ ”

គ - ពូជគ្រឿយស្វាយ

មានស្លឹកផែក សំបក
មើម ពណ៌ក្រហម និង សាច់
មើមពណ៌ស ។

ប្រ-ពូជតែសាង ៦៦

មានស្លឹកពណ៌បៃតង
ទ្រវែង សំបកមើមក្រហម
ចាស់ សាច់ពណ៌ទឹកក្រូច ។



ពូជដំឡូងជ្វា “កែនាង ៦៦”

៣.២ បច្ចេកទេសដាំដុះ

៣.១ - ការស្រែសើសីនិងស្រែកាលដាំដុះ

ដំឡូងជ្វា ជាដំណាំប្រភេទយកមើម ដូច្នេះការជ្រើសរើសដី
សំរាប់ដាំដុះ វាជាការសំខាន់ណាស់ ។ ដីដែលសមស្របសំរាប់ដំឡូង
ជ្វា គឺតំបន់ដីក្រហម ដីភ្នំ ដីល្បាប់ទន្លេ ឬ ស្ទឹង និងដីល្បាប់ខ្សាច់ ។
ចំណែកដីស្រែក៏អាចដាំដុះបានដែរ គឺដាំនៅបន្ទាប់ពីប្រមូលផល
ហើយ ។ ដំឡូងជ្វាគេអាចដាំបាននៅគ្រប់រដូវកាល ។ នៅរដូវ
ភ្លៀងគេត្រូវដាំនៅលើដីទួល ឬ ដីមិនលិចទឹក និង ជាំទឹក ។ ពេល
រេលាដែលល្អសមស្របសំរាប់ដាំដំឡូងជ្វា គឺនៅដើមរដូវភ្លៀង ។

៣.២ - ការស្រែសើសី

បើសិនអ្នកដាំដំឡូងនៅលើដីស្រែ ដែលទើបប្រមូលផលរួច
អ្នកត្រូវភ្ជួរដីចោលឱ្យបាន ២សា ។ ១០ ថ្ងៃ បន្ទាប់មកអ្នកត្រូវបាចដី

លាមកគោមួយរទេះក្នុងផ្ទៃដី ១០ ម៉ែតកាវើ រួចហើយអ្នកត្រូវរាស់
 ត្រឡប់ដីភ្លាម រួចទុកដីចោលរយៈពេល៣ថ្ងៃ ។ ក្រោយមកទៀតអ្នកត្រូវ
 យកនង្គ័លភ្នំប្រណាមរងឱ្យបានជើងរង១ម៉ែត្រ ខ្នងរង៧០ស.ម រួច
 យកចបជួយថែមដីខ្លះទៀត ដើម្បីបំពេញដីរងឱ្យស្អាតល្អ ។ អ្នកមិន
 ត្រូវធ្វើ រងតូចពេកទេ ពីព្រោះដំឡូងចុះមើមមិនបានល្អ ។ ដំឡូងធ្លា
 ជាដំណាំ ដែលមានបូសវែង ដូច្នោះ អ្នកគួរគប្បីភ្នំដីឱ្យបានជម្រៅ
 ប្រហែលពី ២០ ទៅ ៣០ស.ម រួចហើយហាលដីឱ្យបាន ពី ៧ ទៅ
 ១០ ថ្ងៃ រួចច្របល់ ដីឱ្យបានសព្វល្អ ។



ការរៀបចំដី

៣.៣ - ការជ្រើសរើសទងសំរាប់ដាំ

អ្នកត្រូវជ្រើសរើសទងណា ដែលថ្លោស និងខ្ជិល្មម ហើយដែល
 មាន អាយុពី ៤០ ទៅ ៥០ ថ្ងៃ និង មានថ្នាំងញឹកល្អ ។ ប្រវែងទង
 ដែលសមស្របល្អ សំរាប់ដាំនោះ គឺ មានប្រវែងពី ២០ ទៅ ៣០ ស.ម

ហើយអ្នកមិនត្រូវយកទងណា ដែលមានឫសដុះច្រើន នៅតាមថ្នាំង
នោះទេ ម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកត្រូវកាត់ស្លឹកនៅជាប់ទងចោលមួយចំនួន
ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវទុកខ្លះ ។



ការជ្រើសទងដំឡូងសំរាប់ធ្វើពូជដាំបន្ត

៣.៤ - ការរក្សាពូជទុកសំរាប់ដាំ

ប្រសិនបើអ្នកដាំដំឡូងជ្វានៅរដូវសម្រក អ្នកត្រូវដាំពូជស្រាល
ហើយត្រូវ ត្រៀមពូជទុកតាំងពីខែកក្កដា ដោយអ្នកគ្រាន់តែដាំដំឡូងទុក
នៅលើដីទួល ឬ នៅតាមរានខ្ពស់ៗ ដែលដីមានជីជាតិល្អ ហើយមិន
ត្រូវឱ្យដំឡូងត្រូវកំដៅថ្ងៃពេកទេ គឺដើម្បីរក្សាដើមដំឡូងឱ្យនៅខ្ចីល្អ
ដើម្បីទទួលបានផលច្រើន ។

៣.៥ - វិធីដាំ

ការដាំដំឡូងជ្វា វាអាស្រ័យទៅតាមប្រភេទដី ប្រសិនបើដីល្អជា
ដីមាត់ទន្លេអ្នកអាចដាំបានពីរជួរ នៅលើរងមួយ ប៉ុន្តែបើនៅលើប្រភេទ

ដីស្រែអ្នកដាំតែមួយជួរ នៅលើរងមួយជាការល្អ ។ ចន្លោះនៃការដាំ
 ពីដើមមួយទៅដើមមួយប្រវែងពី ៣០ ទៅ ៥០ ស.ម ហើយចន្លោះ
 ពីរងមួយទៅរងមួយ គឺប្រវែង១ម៉ែត្រ ។ អ្នកត្រូវដាក់ទងដំឡូងកប់
 ដីឱ្យធ្លៀងប្រហែល ៤៥ ដីក្រេ ដោយឱ្យចុងទងដំឡូងជុំតពីដីមួយថ្នាំង
 ឬ ពីរថ្នាំង ។



ចន្លោះនៃការដាំទង
 ដំឡូងជាលើដី
 លើកជារង

៣.៦ - ការថែទាំ

ការថែទាំវាជាការងារសំខាន់ណាស់ ដើម្បីទទួលបានទិន្នផល
 ខ្ពស់ ។ នៅពេលអ្នកដាំដំឡូងរួចភ្លាមអ្នកត្រូវយកចំបើង ឬ ស្មៅក្រៀម
 ឬ កំប្លោកគ្របពីលើរងឱ្យជិត ដើម្បីការពារកុំឱ្យក្តៅពេក ឆាប់ខ្សោះទឹក
 ពីក្រោមដី ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតដើម្បីការពារដៃដំឡូងកុំឱ្យប៉ះទៅនឹងដី
 នាំឱ្យវាចាក់ឫសច្រើន ។ បើសិនដំឡូងល្អខ្លាំងពេកអ្នកត្រូវឧស្សាហ៍
 បេះត្រួយ ឬ ក៏ត្រូវកាត់រំលែកដើមខ្លះ ដើម្បីឱ្យមើមរបស់វាថ្លោសល្អ
 ហើយអ្នកអាចយកដើមដែលកាត់នោះទៅធ្វើជាចំណីរបស់សត្វ ។ ទង

ដៃដំឡូងមិនត្រូវឱ្យវារលើសពី២ម៉ែតឡើយ ។ អ្នកមិនត្រូវស្រោចទឹកឱ្យជោគជាំពេកទេ ពីព្រោះវាអាចនាំឱ្យដីក្តាំង ។ បើរាំងភ្លៀងយូរពេកអ្នកត្រូវជ្រោយដីឱ្យម្តង ពូនរងថែមឱ្យបានកំពស់ ៣០ ស.ម ។ អ្នកត្រូវសំអាតស្មៅចោលពេលដំឡូងនៅតូច ហើយគួរជ្រួយពូនជុំវិញគល់ដើម្បីឱ្យដំឡូងចុះមើមល្អ ។ អ្នកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលជ្រួយដីមិនត្រូវអោយដាច់ឫសរបស់ដំឡូងឡើយ ពីព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់ការចុះមើមរបស់ដំឡូង ។



ការថែទាំពោចស្មៅលើរង

៣.៧ - ការប្រមូលផល

អ្នកអាចប្រមូលផលដំឡូងជ្វាបាន នៅពេលដំឡូងជ្វាបានអាយុពី ៩០ទៅ១៥០ថ្ងៃបន្ទាប់ពីដាំរួច ។ ម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដំឡូងជ្វាជិតគ្រប់ខែប្រមូលផល អ្នកគួរគប្បីឧស្សាហ៍ផ្អឹះគល់ឱ្យចមើម ដើម្បីពិនិត្យមើល

មើមរបស់ដំឡូង ដើម្បីឱ្យដឹងថា តើមើមដំឡូងមានគីងស៊ីបូទេ បើគីង
 មិនទាន់ស៊ីមើមដំឡូងទេអ្នកអាចពន្យារពេលប្រមូលផលមួយរយៈទៀត
 ដើម្បីឱ្យមើមកាន់តែធំល្អ ។ ប្រសិនបើអ្នកដាំដំឡូងនៅរដូវប្រាំង អ្នក
 មិនត្រូវទុកឱ្យយូរពេកទេ ពីព្រោះវាអាចនាំឱ្យគីងស៊ីមើមរបស់ដំឡូង
 អ្នកអាចប្រមូលផលដំឡូងដោយគាស់នឹងចបចំពោះផ្ទៃដីតូចៗ បើអ្នក
 ដាំជាលក្ខណៈចំការធំៗ អ្នកអាចប្រមូលផលដំឡូងដោយភ្ជួរ ហើយដើរ
 រើសមើមតែម្តង ។



ការប្រមូលផល
 ដំឡូងជ្វា

៤. ជម្ងឺនិងសត្វល្អិត

ជម្ងឺដែលសំខាន់ចំពោះដំឡូងជ្វា ហើយតែងកើតជាញឹកញាប់
 នោះ គឺជម្ងឺក្រាស៊ីស្លឹក និងជម្ងឺមើមរលួយ ។ ចំណែកឯសត្វល្អិតវិញ
 គឺពពួកដង្កូវដំឡូងឫស គីងដំឡូង និង ចៃ ។