



អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម



គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម

និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច

# សៀវភៅគោរំណែនាំបច្ចេកទេស ស្តីអំពី



## ផលិតកម្មពូជស្រូវ

គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច  
Project for Agricultural Development and Economic Empowerment

២០១៤

សហការជាមួយអង្គការ

**SNV**

## អ្នករៀបរៀង

១. លោក **ជូ បំរើន** មន្ត្រីបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់កសិកម្ម នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម  
២. លោក **កែ សំរឿន** ទីប្រឹក្សាកសិកម្ម ផ្នែកការអប់រំមនុស្សពេញវ័យ នៃអង្គការអភិវឌ្ឍន៍  
ហ្វឡង់ (SNV)

## អ្នកផ្តល់យោបល់កែសម្រួល

១. លោក  
២. លោក  
៣. លោក

## អ្នកត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគុណភាព

១. លោក  
២. លោក  
៣. លោក

## បញ្ជីមាតិកា

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| បញ្ជីរូបភាព .....                                   | v    |
| បញ្ជីតារាង .....                                    | viii |
| បញ្ជីពាក្យកាត់ ជាភាសាខ្មែរ.....                     | ix   |
| បញ្ជីពាក្យកាត់ ជាភាសាអង់គ្លេស .....                 | x    |
| អារម្ភកថា .....                                     | 1    |
| ១. សេចក្តីផ្តើម .....                               | 2    |
| ២. គោលបំណង.....                                     | 2    |
| ៣. បច្ចេកទេសផលិតកម្មគ្រាប់ពូជ.....                  | 3    |
| ៣.១ សញ្ញាណទូទៅនៃគ្រាប់ពូជ .....                     | 3    |
| ៣.២ សារប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ពូជសុទ្ធ .....        | 3    |
| ៣.៣ ចំណាត់ថ្នាក់គ្រាប់ពូជ .....                     | 4    |
| ៣.៤ វិធីសាស្ត្រផលិតពូជ.....                         | 5    |
| ៣.៤.១ ការអ្វប់ចំដីសម្រាប់ថ្នាលសំណាប និងការសាប ..... | 5    |
| ក. ការជ្រើសរើសទីតាំងសម្រាប់ថ្នាលសំណាប .....         | 5    |
| ខ. ប្រភេទថ្នាលសំណាប .....                           | 6    |
| គ. បច្ចេកទេសសាប .....                               | 7    |
| ឃ. ការសាប.....                                      | 9    |
| ៣.៤.២ ការអ្វប់ចំដីសម្រាប់ស្លុង.....                 | 10   |
| ៣.៣.៣ បច្ចេកទេសស្លុង .....                          | 10   |
| ក. ការដកសំណាប .....                                 | 10   |
| ខ. ការអ្វប់ចំខ្នាតសម្រាប់ស្លុង.....                 | 10   |
| គ. ការស្លុង.....                                    | 11   |

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| ៣.៣.៤ ការថែទាំ .....                                         | 12 |
| ក. ប្រភេទដី និងការប្រើប្រាស់ដី.....                          | 12 |
| ខ. ការគ្រប់គ្រងទឹក .....                                     | 16 |
| ខ. ការគ្រប់គ្រងស្មៅ .....                                    | 17 |
| គ. ការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិត .....                               | 18 |
| ឃ. ជំងឺ.....                                                 | 31 |
| ង. ការកាត់ពូជលាយ .....                                       | 44 |
| ៤. ការប្រមូលប្រមូលផល.....                                    | 46 |
| ៤.១ ការច្រូតកាត់.....                                        | 46 |
| ៤.២ ការប្លោកបែន .....                                        | 47 |
| ៤.៣ ការហាលសំងួត .....                                        | 48 |
| ៤.៤ ការសម្អាតគ្រាប់.....                                     | 48 |
| ៤.៥ ការផ្គង់ និងការទុកដាក់ .....                             | 49 |
| ៤.៥ ដំណាក់កាលគ្រាប់.....                                     | 49 |
| ៥. ការវិវាតសេដ្ឋកិច្ច និងការស្ទង់ទិន្នផល .....               | 50 |
| ៥.១ ការវិវាតសេដ្ឋកិច្ច.....                                  | 50 |
| ៥.២ ការស្ទង់ទិន្នផលស្រូវ.....                                | 54 |
| ឯកសារយោង .....                                               | 56 |
| បញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធ .....                                        | 58 |
| សន្និធានក្រុម .....                                          | 59 |
| អាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនងរបស់ក្រុមហ៊ុន ឬស្ថាប័នលក់គ្រាប់ពូជ ..... | 61 |

# បញ្ជីរូបភាព

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| រូបភាព ១ ៖ ការរៀបចំថ្នាលទឹក.....                        | 6  |
| រូបភាព ២ ៖ ការរៀបចំថ្នាលគោក.....                        | 6  |
| រូបភាព ៣ ៖ ថ្នាលដាក់ប៉ុក.....                           | 7  |
| រូបភាព ៤ ៖ ការធ្វើដំណុះសាក.....                         | 8  |
| រូបភាព ៥ ៖ ការដាក់អំបិលក្នុងទឹក និងពងមាន់អណ្តែត.....    | 9  |
| រូបភាព ៦ ៖ ការសាប.....                                  | 9  |
| រូបភាព ៧ ៖ ការរៀបចំដី.....                              | 10 |
| រូបភាព ៨ ៖ ការដកសំណាប.....                              | 10 |
| រូបភាព ៩ ៖ គំរូឃ្លង់ស្រែផលិតកម្មពូជស្រូវ.....           | 11 |
| រូបភាព ១០ ៖ ការស្ទង់ជួរ.....                            | 11 |
| រូបភាព ១១ ៖ ការដកស្មៅដោយដៃ.....                         | 17 |
| រូបភាព ១២ ៖ ការដកស្មៅដោយប្រើឧបករណ៍.....                 | 17 |
| រូបភាព ១៣ ៖ សត្វទ្រីប.....                              | 18 |
| រូបភាព ១៤ ៖ ការបំផ្លាញរបស់សត្វទ្រីប.....                | 18 |
| រូបភាព ១៦ ៖ ដង្កូវហ្វូង.....                            | 19 |
| រូបភាព ១៧ ៖ ការបំផ្លាញរបស់ដង្កូវហ្វូង.....              | 19 |
| រូបភាព ១៨ ៖ សង្កើចខ្មៅ.....                             | 21 |
| រូបភាព ១៩ ៖ ការបំផ្លាញរបស់សង្កើចខ្មៅលើដំណាំស្រូវ.....   | 21 |
| រូបភាព ២០ ៖ មមាចត្នោត.....                              | 22 |
| រូបភាព ២១ ៖ ការបំផ្លាញរបស់មមាចត្នោតលើដំណាំស្រូវ.....    | 23 |
| រូបភាព ២២ ៖ មេអំបៅ និងដង្កូវមូរស្លឹក.....               | 24 |
| រូបភាព ២៣ ៖ ការបំផ្លាញរបស់ដង្កូវមូរស្លឹក.....           | 25 |
| រូបភាព ២៤ ៖ ស្រឹងជញ្ជក់ទឹកដោះ.....                      | 26 |
| រូបភាព ២៥ ៖ ពងស្រឹងជញ្ជក់ទឹកដោះ.....                    | 26 |
| រូបភាព ២៦ ៖ ការបំផ្លាញរបស់ស្រឹងជញ្ជក់ទឹកដោះ.....        | 26 |
| រូបភាព ២៧ ៖ មេអំបៅ ដឹកខ្សែ និងដង្កូវបំពង់កាត់ស្លឹក..... | 27 |
| រូបភាព ២៨ ៖ ការបំផ្លាញរបស់ដង្កូវបំពង់កាត់ស្លឹក.....     | 27 |

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| រូបភាព ២៩ ៖ ដង្កូវស្ទឹងដើម .....                                     | 28 |
| រូបភាព ៣១ ៖ មេអំបៅញី.....                                            | 29 |
| រូបភាព ៣០ ៖ មេអំបៅឈ្មោល.....                                         | 29 |
| រូបភាព ៣២ ៖ ការបំផ្លាញរបស់ដង្កូវស្ទឹងដើម .....                       | 29 |
| រូបភាព ៣៣ ៖ កណ្តុរ .....                                             | 30 |
| រូបភាព ៣៤ ៖ រោគសញ្ញាជំងឺប្លាស់លើស្លឹក .....                          | 31 |
| រូបភាព ៣៥ ៖ រោគសញ្ញាជំងឺប្លាស់លើដើម .....                            | 32 |
| រូបភាព ៣៦ ៖ រោគសញ្ញាជំងឺប្លាស់លើកូរ .....                            | 32 |
| រូបភាព ៣៧ ៖ រោគសញ្ញាជំងឺរលាកស្លឹក.....                               | 33 |
| រូបភាព ៣៨ ៖ រោគសញ្ញាបំផ្លាញរបស់ជំងឺរលាកស្លឹកនៅដំណាក់កាលដាក់ម្សៅ..... | 33 |
| រូបភាព ៣៩ ៖ រោគសញ្ញាបំផ្លាញរបស់ជំងឺរលាកស្លឹក .....                   | 33 |
| រូបភាព ៤០ ៖ រោគសញ្ញាជំងឺឆ្លុតស្លឹក.....                              | 34 |
| រូបភាព ៤១ ៖ រោគសញ្ញាជំងឺរលាកស្រទប់ស្លឹក .....                        | 36 |
| រូបភាព ៤២ ៖ រោគសញ្ញានៃការបំផ្លាញរបស់ជំងឺរលាកស្រទប់ស្លឹក .....        | 36 |
| រូបភាព ៤៣ ៖ រោគសញ្ញានៃជំងឺទង់គ្រោ .....                              | 37 |
| រូបភាព ៤៤ ៖ រោគសញ្ញាបំផ្លាញរបស់ជំងឺទង់គ្រោ.....                      | 37 |
| រូបភាព ៤៥ ៖ រោគសញ្ញារបស់ជំងឺត្បឿស្មៅ.....                            | 38 |
| រូបភាព ៤៦ ៖ រោគសញ្ញាបំផ្លាញរបស់ជំងឺត្បឿស្មៅ.....                     | 39 |
| រូបភាព ៤៧ ៖ ជំងឺត្បឿញស្លឹក .....                                     | 39 |
| រូបភាព ៤៨ ៖ រោគសញ្ញាបំផ្លាញរបស់ជំងឺត្បឿ ញស្លឹក.....                  | 40 |
| រូបភាព ៤៩ ៖ ជំងឺរលាកស្រទប់ស្លឹក .....                                | 40 |
| រូបភាព ៥០ ៖ រោគសញ្ញាបំផ្លាញរបស់ជំងឺរលាកស្រទប់ស្លឹក .....             | 41 |
| រូបភាព ៥១ ៖ ជំងឺខ្វះសារធាតុអាសូត .....                               | 42 |
| រូបភាព ៥២ ៖ ការបាចជី.....                                            | 42 |
| រូបភាព ៥៣ ៖ ជំងឺខ្វះសារធាតុផូស្វ័រ .....                             | 42 |
| រូបភាព ៥៤ ៖ ការបាចជី.....                                            | 43 |
| រូបភាព ៥៥ ៖ ជំងឺពុលដែក .....                                         | 43 |
| រូបភាព ៥៦ ៖ ជំងឺពុលប្រៃ.....                                         | 44 |
| រូបភាព ៥៧ ៖ ស្រូវក្នុងដំណាក់កាលចេញផ្កា .....                         | 45 |

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| រូបភាព ៥៨ ៖ ស្រូវក្នុងដំណាក់កាលទុំ .....            | 46 |
| រូបភាព ៥៩ ៖ ការច្រូតកាត់ដោយដៃ .....                 | 46 |
| រូបភាព ៦០ ៖ ការច្រូតកាត់ដោយម៉ាស៊ីន.....             | 47 |
| រូបភាព ៦១ ៖ ការបែនស្រូវ .....                       | 47 |
| រូបភាព ៦២ ៖ ការហាលសំងួត .....                       | 48 |
| រូបភាព ៦៣ ៖ កង្ហានិងឧបករណ៍បក់សម្អាតគ្រាប់ស្រូវ..... | 48 |
| រូបភាព ៦៤ ៖ ការវេចខ្ចប់ស្រូវពូជត្រឹមត្រូវ .....     | 49 |
| រូបភាព ៦៥ ៖ ការទុកដាក់ស្រូវពូជត្រឹមត្រូវ.....       | 49 |

## បញ្ជីតារាង

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| តារាង ១ ៖ តារាងគម្លាតគុម្ពសន្ធឹង .....          | 12 |
| តារាង ២ ៖ តារាងក្រុមដី និងការប្រើប្រាស់ដី ..... | 12 |
| តារាង ៣ ៖ តារាងការបាចដីទ្រាប់បាត .....          | 15 |
| តារាង ៤ ៖ តារាងការបាចដីបំប៉ន .....              | 16 |
| តារាង ៥ ៖ តារាងកម្រិតទឹកក្នុងស្រែ .....         | 17 |



## បញ្ជីពាក្យកាត់ ជាភាសាខ្មែរ

### ពាក្យកាត់

### ពាក្យពេញ

គក្រ

គឺឡូក្រាម

ត

តោន

ម

ម៉ែត្រ

មម

មីលីម៉ែត្រ

ម.ល

មីលីលីត្រ

ម<sup>២</sup>

ម៉ែត្រក្រឡា ឬម៉ែត្រការ៉េ

ស.ម

សង់ទីម៉ែត្រ

ហា.ត

ហិចតា

## បញ្ជីពាក្យកាត់ ជាភាសាអង់គ្លេស

### ពាក្យកាត់

### ពាក្យពេញ

CARDI

Cambodian Agricultural Research and Development Institute

វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា

K

Potassium (ដីប៉ូតាស្យូម)

Mg

Magnesium (ដីម៉ាញ៉េស្យូម)

N

Nitrogen (ដីអាសូត)

P

Phosphorus (ដីផូស្វាត/ផូស្វ័រ)

PADEE

Project for Agriculture Development and Economic

Empoverment

គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច

SNV

Netherlands Development Organization

អង្គការ អភិវឌ្ឍន៍ ហូឡង់

## អារម្ភកថា

អត្រាកំណើនប្រជាជននៅលើពិភពលោកបានបន្តកើនឡើងជាលំដាប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ គួបផ្សំទៅនឹងកត្តាបំបែកបំប្លែងអាកាសធាតុដែលកំពុងតែជួបប្រទះនាពេលបច្ចុប្បន្ន បានធ្វើឲ្យការបង្កបង្កើនផលស្រូវជួបប្រទះនូវបញ្ហាឥតឈប់ឈរ មិនអាចផ្គត់ផ្គង់បានគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមសេចក្តីត្រូវការទីផ្សារ។ ប្រជាភស្តុភារនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាភាគច្រើន បានអនុវត្តការដាំដុះទៅតាមទម្លាប់នៅឡើយ ដូចជា៖ ការរៀបចំដី ការប្រើប្រាស់ដី ការថែទាំ ការប្រើប្រាស់ពូជ និងការទុកដាក់ពូជជាដើម ដែលជាហេតុនាំឲ្យទិន្នផលដែលទទួលបាននៅមានកំរិតទាប។

ប៉ុន្តែដោយមានការខិតខំប្រឹងប្រែងពីមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានចូលរួមបណ្តុះបណ្តាលកសិករទៅដល់តំបន់ផលិតកម្មជាច្រើនវគ្គ រហូតដល់ឆ្នាំ១៩៩៥បានធ្វើឲ្យផលិតផលស្រូវមានការកើនឡើងបានគ្រប់សេចក្តីត្រូវការក្នុងស្រុកនិងមានអតិរេកប្រមាណ៥ សែនតោន។ ចាប់ពីពេលនោះមក ផលិតកម្មស្រូវមានការកើនឡើងជាលំដាប់នឹងមានបរិមាណសរុបចំនួន ៩,២៩លានតោន នៅឆ្នាំ២០១២ ជាមួយនឹងការកើនឡើងទិន្នផលពី១,៦៥ត/ហិកតាឆ្នាំ១៩៩៥ ទៅ ៣,១១៧ ត/ហិកតាឆ្នាំ២០១២។

យោងតាមអតិរេកនេះ និងស្របតាមសេចក្តីត្រូវការអង្ករក្នុងពិភពលោកកាន់តែកើនឡើង កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១០ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវ **ឯកសារគោលនយោបាយស្តីពីការជំរុញផលិតកម្មស្រូវនិងការនាំចេញអង្ករ** ក្នុងទិសដៅសម្រេចឲ្យបាននូវអតិរេកស្រូវជាង៤លានតោននិងការនាំអង្ករចេញជាផ្លូវការយ៉ាងតិចឲ្យបាន ១លានតោននៅឆ្នាំ២០១៥។ ដើម្បីចូលរួមចំណែកអនុវត្តគោលនយោបាយនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងទទួលបានជោគជ័យនាយកដ្ឋានដំណាំស្រូវនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មសហការជាមួយអង្គការ (SNV) ឧបត្ថម្ភថវិកាពីគម្រោង អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច (PADEE) បានរៀបចំចងក្រងសៀវភៅស្តីពី " **គោលការណ៍ណែនាំបច្ចេកទេសស្តីពីផលិតកម្មពូជស្រូវ** " ដោយផ្អែកលើឯកសារបច្ចេកទេសស្តីពីជាច្រើន និងបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែងស្របតាមលក្ខខណ្ឌតំបន់នៃប្រទេសកម្ពុជា។ នៅក្នុងឯកសារនេះ យើងបានណែនាំតែអំពីបច្ចេកទេសផលិតពូជស្រូវសុទ្ធស្តី (Good Seed/ commercial seed) តែប៉ុណ្ណោះ ព្រោះវាមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់កសិករក្នុងការអនុវត្ត។

យើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ ទទួលយកនូវគំនិតយោបល់កែលម្អពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីឲ្យសៀវភៅនេះកាន់តែមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារប្រសើរឡើង ហើយសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថា សៀវភៅនេះនឹងផ្តល់នូវគំនិតថ្មីៗ មូលដ្ឋានបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកអនុវត្តផលិតកម្មពូជ ជាពិសេសកសិករតាមមូលដ្ឋានផលិតកម្មយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងទិសដៅបង្កើនផលិតភាព និងប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាប្រទេសជាតិទាំងមូល។

## ១. សេចក្តីផ្តើម

ស្រូវគឺជាដំណាំដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារកសិករជនបទនិងប្រទេសជាតិទាំងមូល ជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើននៅទីជនបទប្រកបមុខរបរកសិកម្ម លើផលិតកម្មដំណាំស្រូវ។ មកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ថិតិទិន្នផលស្រូវដែលទទួលបានក្នុងទូទាំងប្រទេស មិនទាន់ឆ្លើយតបទៅតាមមហិច្ឆិតាគោលបំណងរបស់អ្នកបច្ចេកទេសនៅឡើយ ពោលគឺស្ថិតក្នុងរង្វង់កំរិតទាប បើធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបណ្តាប្រទេសផលិតស្រូវនៅជិតខាង។ បញ្ហានេះ គឺដោយសារតែប្រជាកសិករភាគច្រើន នៅមានការយល់ដឹងទាប ទាក់ទងជាមួយនឹងការដាំដុះ និយាយរួមគឺការដាំដុះតាមបែបទម្លាប់មិនត្រឹមត្រូវទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេស ដូចជា ៖ ការប្រើប្រាស់ពូជ ការប្រើប្រាស់ដី ការថែទាំ និងការទុកដាក់ពូជជាដើម ។

ការប្រើប្រាស់ពូជបានត្រឹមត្រូវ វាជាកត្តាមួយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងផលិតកម្មដំណាំស្រូវ អាចបង្កើនផលិតភាព និងគុណភាពផលិតផលដំណាំឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរ។ ការជម្រុញកសិករឲ្យប្រើប្រាស់ពូជសុទ្ធ មានលក្ខណៈទូលំទូលាយ ត្រូវការយន្តការផលិតគ្រាប់ពូជមួយដែលមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់យើងទាំងអស់គ្នា(អ្នកបច្ចេកទេសនិងកសិករ)។ កន្លងមកកសិករនៅមិនទាន់មានបច្ចេកទេសគ្រាប់គ្រាន់ក្នុងការផលិតពូជ ការទុកដាក់ និងថែរក្សាពូជ បានដោយខ្លួនឯងនៅឡើយ ហើយក៏បានប្រើប្រាស់ពូជដដែលៗជាច្រើនឆ្នាំ ដែលជាហេតុនាំឲ្យផលទទួលបាននៅមានកំរិត ទាំងបរិមាណនិងគុណភាពនិងមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅតាមតម្រូវការ និងស្តង់ដារទីផ្សារ ។

ដូចនេះដើម្បីជម្រុញផលិតភាព និងគុណភាពផលិតកម្មស្រូវរបស់កសិករឲ្យកាន់តែប្រសើរ ហើយឆ្លើយតបបានទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារ គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច (PADEE) របស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ ដែលមាននាយកដ្ឋានដំណាំស្រូវនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មសហការជាមួយអង្គការដៃគូ(SNV) បានផលិតនូវគោលការណ៍ណែនាំបច្ចេកទេសស្តីពីផលិតកម្មពូជស្រូវសម្រាប់បណ្តុះបណ្តាលប្រជាកសិករកម្ពុជានៅតាមខេត្តគោលដៅរបស់គម្រោង ។

## ២. គោលបំណង

គោលការណ៍ណែនាំបច្ចេកទេសអំពីផលិតកម្មពូជស្រូវនេះផលិតឡើងក្នុងគោលបំណង ៖

- ផ្តល់ចំណេះដឹងលើបច្ចេកទេសផលិត និងប្រើប្រាស់ពូជស្រូវប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
- ដើម្បីទទួលបានទិន្នផលស្រូវក្នុងបរិមាណផលខ្ពស់
- ឲ្យកសិករចេះធ្វើការជាក្រុមក្នុងការបង្កើតផែនការនិងការផលិតគ្រាប់ពូជដែលមានគុណភាព
- ជួយពង្រឹងគុណភាពផលិតភាពកសិកម្មដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារ

### ៣. បច្ចេកទេសផលិតកម្មគ្រាប់ពូជ

#### ៣.១ សញ្ញាណទូទៅនៃគ្រាប់ពូជ

គ្រាប់ពូជស្រូវ គឺជាគ្រាប់ស្រូវដែលមានជីវិត បានមកពីការជ្រើសរើសយ៉ាងហ្មត់ចត់ និងត្រឹមត្រូវ ទៅតាមបច្ចេកទេស។ ការប្រើប្រាស់គ្រាប់ពូជសុទ្ធឈ្នឹងអាចជួយបង្កើនទិន្នផលស្រូវបានប្រមាណ ៥%-២០% ។ គ្រាប់ពូជ ដែលល្អ មានលក្ខណៈដូច ខាងក្រោម៖

- គ្រាប់ពូជមានមានភាពសុទ្ធខ្ពស់ គឺមិនលាយគ្រាប់ពូជផ្សេងៗ និងគ្រាប់ស្មៅ ។
- គ្រាប់ពូជមិនមានផ្ទុកនូវជំងឺ ឬភ្នាក់ងារបង្ករោគផ្សេងៗ និងការបំផ្លាញរបស់សត្វល្អិត ។
- គ្រាប់ពូជមានសម្បុរថ្លា និងគ្រាប់អង្ករមិនមានប្រេះស្រាំ ឬបាក់ ។
- គ្រាប់ពូជមានជំនុះខ្ពស់ (ខ្ពស់ជាង ៨៥%) និងលូតលាស់ខ្លាំង ។
- គ្រាប់ពូជមានសំណើមទាប (១២% -១៤%) ។
- ស្រូវពូជមិនមានលាយសំដីច្រើន (មិនលើសពី ២%) ។
- ស្រូវពូជមានគ្រាប់ពេញល្អ និងមានឯកសណ្ឋានភាព (ប្រវែង ទំហំ និងពណ៌សម្បុរ ។ល។) ។
- ស្រូវពូជនៅរក្សាបាននូវលក្ខណៈសេនេទិកដើម ។

#### ៣.២ សារប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ពូជសុទ្ធ


- ការប្រើប្រាស់គ្រាប់ពូជសុទ្ធឈ្នឹងអាចជួយបង្កើនទិន្នផលស្រូវបានប្រមាណ ៥%-២០% ។
- ធ្វើឲ្យកសិករអាចកាត់បន្ថយបាននូវការប្រើប្រាស់គ្រាប់ពូជ ។
- ធ្វើឲ្យអត្រាគ្រាប់ពូជដុះក្នុងស្រែបានខ្ពស់ជាអតិបរិមា ។
- ធ្វើឲ្យសំណាបឬដើមស្រូវដុះលូតលាស់ខ្លាំង ។
- ធ្វើឲ្យដំណាំស្រូវមានអត្រាជំនុះគ្រាប់ដុះស្មើគ្នាល្អ ។
- ធ្វើឲ្យកំរិតលូតលាស់លឿននិងភាពធន់ទ្រាំនឹងជំងឺនិងសត្វល្អិតកាន់តែខ្លាំង ។
- ធ្វើឲ្យដំណាំស្រូវទុំស្រុះគ្នាល្អ ។
- ធ្វើឲ្យស្រូវ អង្ករ មានគុណភាពខ្ពស់ (មិនលាយគ្រាប់ពូជផ្សេងនិងគ្រាប់ស្មៅចង្រៃ) ។
- ធ្វើឲ្យតម្លៃស្រូវ អង្ករមានតម្លៃខ្ពស់នៅលើទីផ្សារ ។

### ៣.៣ ចំណាត់ថ្នាក់គ្រាប់ពូជ

គេចែកគុណភាពគ្រាប់ពូជស្រូវជា ៥ ចំណាត់ថ្នាក់ ដូចខាងក្រោម ៖

- គ្រាប់ពូជសុទ្ធជម្រើសវិទូ ( Breeder seed) ៖ ត្រូវបានផលិតឡើងដោយអ្នកបង្កាត់ពូជ ហើយគ្រាប់ពូជនេះ តំណាង ឱ្យខ្សែស្រឡាយពិតប្រាកដនៃប្រភេទពូជនីមួយៗ។ គេប្រើប្រាស់វាសម្រាប់ផលិតគ្រាប់ពូជសុទ្ធត្រី ។
- គ្រាប់ពូជសុទ្ធត្រី (Foundation seed) ៖ ត្រូវបានផលិតឡើងដោយអ្នកបង្កាត់ពូជ។ គេប្រើប្រាស់វាសម្រាប់ផលិត គ្រាប់ពូជសុទ្ធទទួលស្គាល់។
- គ្រាប់ពូជសុទ្ធទទួលស្គាល់ (Registered seed) ៖ ត្រូវបានផលិតឡើងដោយមន្ត្រីបច្ចេកទេស ឬអ្នកបច្ចេកទេសនៅ តាមស្ថានីយ៍។ គេប្រើប្រាស់វាសម្រាប់ផលិតគ្រាប់ពូជសុទ្ធអនុញ្ញាត។
- គ្រាប់ពូជសុទ្ធអនុញ្ញាត (Certified seed) ៖ ត្រូវបានផលិតឡើងដោយមន្ត្រីបច្ចេកទេស ឬអ្នកបច្ចេកទេសនៅតាមស្ថានីយ៍។ គេប្រើប្រាស់វាសម្រាប់ផលិតគ្រាប់ពូជសុទ្ធល្អ។
- គ្រាប់ពូជសុទ្ធល្អ (Good seed/commercial seed) ៖ ត្រូវបានផលិតឡើងដោយមន្ត្រីបច្ចេកទេសក្រុមហ៊ុន ឬកសិករ នៅតាមសហគមន៍សម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយ ឬធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ។

## ប្រព័ន្ធផលិតកម្មគ្រាប់ពូជសុទ្ធ



### ៣.៤ វិធីសាស្ត្រផលិតពូជ

#### ៣.៤.១ ការរៀបចំដីសម្រាប់ថ្នាលសំណាម និងការសាម

##### ក. ការជ្រើសរើសទីតាំងសម្រាប់ថ្នាលសំណាម

ការជ្រើសរើសទីតាំងសម្រាប់ថ្នាលសំណាមគឺជាប្រការដ៏ប្រសើរបំផុតសម្រាប់ការផលិតពូជ។ ដូចនេះកសិករគួរតែប្រើជ្រើសរើសទីតាំងដូចខាងក្រោម៖

- ជ្រើសរើសស្រែដែលរាបស្មើ និងដីមានជីជាតិ ។
- មិនត្រូវជ្រើសរើសស្រែដែលនៅក្រោមម្លប់។
- ស្រែដែលជ្រើសរើសសំរាប់ធ្វើថ្នាលសំណាមគួរតែនៅក្បែរប្រភពទឹក ។
- ស្រែដែលជ្រើសរើសសំរាប់ថ្នាលសំណាមមិនត្រូវអោយមានសំណាមនៃពូជដទៃឡើយ ។
- ស្រែដែលជ្រើសរើសយកមកធ្វើថ្នាលសំណាមសំរាប់ដាំពូជផ្សេងៗគ្នា ត្រូវតែស្ថិតនៅឆ្ងាយពីគ្នា ឬត្រូវខ្ចីណាចកពីគ្នាដោយគ្លី ។

- ថ្នាលសំណាបនៃពូជ ២ ឬ ច្រើននៅក្នុងស្រែដែលជាប់គ្នាត្រូវសាបក្នុងពេលវេលាខុសៗគ្នា ដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលការលាយនៃគ្រាប់ពូជខុសៗគ្នានៅក្នុងថ្នាលសំណាប ។

## ខ. ប្រភេទថ្នាលសំណាប

### ខ.១ ថ្នាលទឹក

- ត្រូវរៀបចំថ្នាលសំណាបត្រូវបំផុសដីឲ្យបានម៉ដ្ឋល្អ ហើយហាលថ្ងៃឲ្យបានពី ៧ ទៅ ១០ថ្ងៃ សម្អាតស្មៅ និងពង្រាបដីឲ្យបានស្មើល្អ ។
- ប្រើដីធម្មជាតិ (ដីកំប៉ុស្ត) ដែលពុកផុយក្នុងបរិមាណប្រហែល ២០០គីឡូក្រាម ឬប្រហែល ១ រទេះគោក្នុងផ្ទៃដីទំហំ ១០០ ម<sup>២</sup> ឬ ១ អា ដោយដាក់ពង្រាយឲ្យសព្វពេញថ្នាល ។
- ឆ្លុះជាចង្អុលដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបញ្ចេញ បញ្ចូលទឹក ។



រូបភាព ១ ៖ ការរៀបចំថ្នាលទឹក

### ខ.២ ថ្នាលគោក

- ត្រូវរៀបចំថ្នាលសំណាបត្រូវបំផុសដីឲ្យបានម៉ដ្ឋល្អ ហើយហាលថ្ងៃឲ្យបានពី ៧ ទៅ ១០ថ្ងៃ សម្អាតស្មៅ និងពង្រាបដីឲ្យបានស្មើល្អ ។
- ប្រើដីធម្មជាតិ (ដីកំប៉ុស្ត) ដែលពុកផុយក្នុងបរិមាណប្រហែល ២០០គីឡូក្រាម ឬប្រហែល ១ រទេះគោក្នុងផ្ទៃដីទំហំ ១០០ ម<sup>២</sup> ឬ ១ អា ដោយដាក់ពង្រាយឲ្យសព្វពេញថ្នាល ។
- លើកថ្នាលជារងដែលមានទទឹងពី ១.២ ម ទៅ ១.៥ ម កំពស់ថ្នាលពី ៤ទៅ ៥ស.ម និងបណ្តោយអាស្រ័យទៅតាមទំហំដី និងស្ថានភាពជាក់ស្តែង ។



រូបភាព ២ ៖ ការរៀបចំថ្នាលគោក



### ខ.៣ ថ្នាលដាក់ប៉ុក

- រៀបចំល្បាយដីដែលមានដី ៥០% ដីកំប៉ុស្ត ៣០% និងដេរ(ដាក់ត្រាំទឹក ២៤ម៉ោងដើម្បីបន្សាបជាតិប្រៃ) ចំនួន ២០% រួចលាយឲ្យសព្វល្អ ។
- ដាក់បន្ទះឬស្បៀកម្តស់ ៣ ស.ម. នៅសងខាងរងដើម្បីទប់ដីកុំឲ្យហូរចេញពីថ្នាល ។
- យកស្លឹកចេក ឬផ្ទាំងកៅស៊ូផ្លាស្ទិកក្រាលពីក្រោមផ្ទៃថ្នាលសំណាបដើម្បីទប់ស្កាត់ការចាក់ឬសរបស់កូនសំណាបទៅក្នុងដី ។
- រៀបចំថ្នាលសំណាបដែលមានទទឹង ១ ម និងបណ្តោយ ៥ម ទៅ ១០ ម អាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពដី ។
- ចាក់ល្បាយដែលបានលាយបញ្ចូលគ្នារួចទៅលើថ្នាលក្នុងកម្រាស់ ៣ ស.ម និងកៀរពង្រាបឲ្យស្មើល្អ ។
- គ្រាប់ពូជត្រូវប្រើពី ៣០ គក្រ ទៅ ៤០ គក្រ ក្នុងដី ១ ហិកតា ។



រូបភាព ៣ ៖ ថ្នាលដាក់ប៉ុក


### គ. បច្ចេកទេសសាប

#### គ.១ ការធ្វើបណ្តុះសាក

ដើម្បីកំណត់បរិមាណពូជដែលត្រូវសាបឲ្យបានសមស្រប ។ វិធីសាស្ត្រដំណុះសាកអនុវត្តដូចខាងក្រោម៖

- ជ្រើសរើសគ្រាប់ដោយចៃដន្យចំនួន ៣ (បី) កន្លែងនៃបារពូជ៖ ខាងលើ កណ្តាល និងខាងក្រោម រួចដាក់បញ្ចូលគ្នា ជ្រើសរើសដោយចៃដន្យ ១០០គ្រាប់ទាំងគ្រាប់ល្អ និងអន់រួចធ្វើជា ៥សំណាក ។
- ដាក់គ្រាប់ស្រូវដែលរាប់រួចក្នុងកែវ ឬបានរួចចាក់ទឹកចូលរហូតដល់លិចគ្រាប់ស្រូវក្នុងកម្រិតប្រមាណ ៣ ស.ម កូរឲ្យសព្វ រួចគ្រប ហើយយកទៅរក្សាទុកក្នុងកន្លែងមានសុវត្ថិភាព ។
- បីថ្ងៃក្រោយយើងអាចរាប់ចំនួនគ្រាប់ដុះ និងមិនដុះ ។ ចំនួនគ្រាប់ដុះសរុបគឺជាអត្រានៃដំណុះពូជ ។

- តាមលទ្ធផលដំណោះស្រាយយើងអាចគណនាបានពីបរិមាណគ្រាប់ពូជសមស្របសម្រាប់យកទៅសាបបាន ។





រូបភាព ៤ ៖ ការធ្វើដំណោះស្រាយ

## ៣.២ វិធីជ្រើសរើសគ្រាប់ពូជពេញយកទៅសាប

- យកគ្រាប់ពូជទៅហាលថ្ងៃក្នុងរយៈពេល ២ ទៅ ៣ ម៉ោងជាមុនដើម្បីដាស់ដំណើរគ្រាប់ពូជ រួចទុកឲ្យត្រជាក់ ។
- ចាក់ទឹកដាក់ក្នុងធុង ឬចានដែកក្នុងកម្រិត ២ ភាគ ៣ រួចយកពងមាន់ ឬពងទាដែលល្អទៅដាក់ក្នុងធុង ឬចានដែកនោះ ។
- ចាក់អំបិលមួយចំនួនចូលទៅក្នុងធុងនោះរួចក្លរាឲ្យរលាយអស់រហូតដល់ពងមាន់ ឬពងទានោះអណ្តែតឡើងលើផ្ទៃទឹក ។
- ចាក់គ្រាប់ពូជប្រមាណពាក់កណ្តាលធុង រួចកូរឲ្យសព្វ ។
- កៀរយកសំដី គ្រាប់ស្មៅ និងគ្រាប់ស្រូវណាដែលអណ្តែតចេញ ។
- ស្រង់យកគ្រាប់ដែលនៅក្នុងធុងទុកមួយកន្លែង ធ្វើបន្តរហូតដល់អស់គ្រាប់ពូជ ។

ត្រូវយកគ្រាប់ពូជដែលប្រឡាក់ទឹកអំបិលទៅលាងឲ្យស្អាតមុនយកទៅត្រាំ បើមិនដូចនោះទេវាប៉ះពាល់ដល់ដំណុះគ្រាប់ ។



រូបភាព ៥ ៖ ការដាក់អំបិលក្នុងទឹក និងពងមាន់អណ្តែត

#### ឃ. ការសាប

- គ្រាប់ពូជមុនពេលយកទៅសាបត្រូវត្រាំទឹក រយៈពេល ២៤ ម៉ោង ហើយផ្លាស់រយៈពេល ពី ២៤ ម៉ោង ។
- ដង់ស៊ីតេគ្រាប់ពូជសម្រាប់សាបគឺ ០.១ គក្រ ក្នុងផ្ទៃដី ១ ម<sup>២</sup> ។
- សម្រាប់ស្ទូងដីទំហំ ១ហិកតា ផ្ទាល់សំណាប ត្រូវរៀបចំទំហំពី ១៥០ ម<sup>២</sup> ទៅ ២០០ម<sup>២</sup> និងពូជសុទ្ធល្អចំនួនពី ១៥ ទៅ ២០ គក្រ ។
- ត្រូវសាបឲ្យស្មើដៃ និងរង្វើលដើម្បីទទួលបានសំណាបថ្លោសល្អ ។
- ចំពោះផ្ទាល់ដាក់ប៉ុកត្រូវរាយគ្រាប់ពូជដែលដុះពន្លកបន្ទាប់ពីផ្តាប់ ២៤ ម៉ោងមករាយក្នុង ១ គក្រ ក្នុងផ្ទៃផ្ទាល់ ១ ម<sup>២</sup> ។ រួចយកក្តាមកសង្កត់ថ្មមៗលើផ្ទាល់រួចស្រោចទឹកឲ្យជោគល្អ។



រូបភាព ៦ ៖ ការសាប

### ៣.៤.២ ការរៀបចំដីសម្រាប់ស្ទួន

ការរៀបចំដីមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើការលូតលាស់របស់ដំណាំស្រូវ ។ ការភ្ជួរលប់ស្មៅ និងគល់ជញ្ជាំងគឺធ្វើឱ្យដីស្រែធុសល្អ និងមានរន្ធខ្យល់ច្រើនដែលអាចជួយសម្រួលដល់ការលូតលាស់របស់ប្រព័ន្ធបូស និងបង្កើនជីជាតិដី។ ការភ្ជួរលាស់ និងហាលដីបានល្អធ្វើឱ្យងាប់ស្មៅចង្រៃ ជាពិសេសអាចសម្លាប់ពពួកផ្សិត សម្លាប់ពង ដឹកខ្មៅ និងសត្វល្អិតសេសសល់ក្នុងស្រែ។ ជាទូទៅដីស្រែត្រូវភ្ជួរឱ្យបានសព្វល្អ ភ្ជួរឱ្យបានជម្រៅពី ១៥ស.ម ទៅ ២៥ស.ម ចំពោះដីល្បាយឥដ្ឋ និងជម្រៅពី ៨ ស.ម ទៅ ១២ ស.ម ចំពោះប្រភេទដីល្បាយខ្សាច់ ហើយត្រូវភ្ជួរឱ្យបានពី ២ ទៅ ៣ ដង រួចរាស់ និងកៀរពង្រាបដីឱ្យបានរាបស្មើល្អ។ ការពង្រាបដីបានល្អធ្វើឱ្យងាយស្រួលបញ្ចេញបញ្ចូលទឹក និងធ្វើឱ្យដីរត់ស្ទើរល្អក្នុងស្រែ ។



រូបភាព ៧ ៖ ការរៀបចំដី

### ៣.៣.៣ បង្កើតទេសស្ទួន

#### ក. ការដកសំណាប

សម្រាប់ការផលិតដោយស្ទួនយើងគប្បីប្រើប្រាស់សំណាបដែលមានសុខភាពល្អ និងសំណាបខ្ចី។ ការដកសំណាបកសិករត្រូវ៖

- ដកថ្មមៗ និងដោយប្រុងប្រយ័ត្នកុំឱ្យសំណាបមានរបួស ។
- ដកយកតែដើមថ្លោសល្អ
- ដកភ្លាមស្ទួនភ្លាម
- ដកសំណាបខ្ចីអាយុពី ១៧ ទៅ ២០ថ្ងៃ ចំពោះស្រូវស្រាល ពី ២៥ ទៅ ៣០ ថ្ងៃ ចំពោះស្រូវ កណ្តាល និង ពី ៣០ ទៅ ៣៥ ថ្ងៃ ចំពោះស្រូវឆ្នង




រូបភាព ៨ ៖ ការដកសំណាប

#### ខ. ការរៀបចំខ្នាតសម្រាប់ស្ទួន

មុននឹងចាប់ផ្តើមស្ទួនកសិករគួរតែរៀបចំសម្ភារឱ្យបានស្រេចជាមុន ជាពិសេសខ្នាត និងខ្សែសម្រាប់ប្រើពេលស្ទួន ។ ខ្សែសម្រាប់ធ្វើជាខ្នាតសម្រាប់ស្ទួនកសិករអាចប្រើខ្សែលូស ឬខ្សែនីឡុង ហើយខ្នាតសម្រាប់ស្ទួនក្នុងផលិតកម្មគ្រាប់ពូជក្នុងគម្លាតពីគុម្ពមួយទៅគុម្ពមួយប្រវែង២០ ស.ម (២ តីក) ។



ដូចគ្នានេះដែរដើម្បីកុំឲ្យមានមានការឆ្គងពូជ កាត់ពូជផ្សេងកសិករត្រូវស្វែងឲ្យបានឃ្លាឆ្ងាយពីភ្លឺស្រែឲ្យបានប្រវែង ១.៥ ទៅ ២ ម៉ែត្រ ។ ខាងក្រោមនេះជាគំរូខ្នាតនៃស្រែសម្រាប់ផលិតពូជ ៖



រូបភាព ៩ ៖ គំរូបង្គំស្រែផលិតកម្មពូជស្រូវ

\* ក្នុងផ្ទៃការពារកសិករអាចស្វែងស្រូវបាន តែត្រូវប្រើប្រាស់ប្រភេទពូជដូចគ្នា

### គ. ការស្វែង

ការស្វែងនៅក្នុងការផលិតពូជស្រូវ  
កសិករត្រូវ៖

- ស្វែងជាជួរ  
ដែលមានចន្លោះពីគុម្ពមួយទៅគុម្ពមួយ  
២០ស.ម x ២០ស.ម
- ស្វែងចាប់ ១ ដើម ឬច្រើនបំផុត ២  
ដើម ក្នុងមួយគុម្ព



រូបភាព ១០ ៖ ការស្វែងជួរ

**តារាង ១ ៖ តារាងគម្លាតគុម្ភសន្លុង**

| ប្រភេទពូជ     | ប្រភេទដី       | រដូវប្រាំង (ស.ម)  | រដូវវស្សា (ស.ម)   |
|---------------|----------------|-------------------|-------------------|
| ពូជក្នុងស្រុក | ដីខ្សាច់ដីជាតិ | ២៥ x ២៥           | ២៥ x ២៥           |
|               | ដីមានដីជាតិល្អ | ៣០ x ៣០           | ៣០ x ៣០           |
| ពូជទំនើប      | ដីខ្សាច់ដីជាតិ | ២០ x ២០ ឬ ២០ x ១៥ | ២០ x ២០ ឬ ២០ x ១៥ |
|               | ដីមានដីជាតិល្អ | ២០ x ២០           | ២០ x ២០           |

ប្រភព៖ បទបង្ហាញស្តីពីការផលិតពូជតាមវិធានការបែបដាំដុះរបស់ លោក ឡាយ ឡេងហួត

**៣.៣.៤ ការថែទាំ**

**ក. ប្រភេទដី និងការប្រើប្រាស់ដី**

បរិមាណនៃការប្រើប្រាស់ដីគឺអាស្រ័យទៅលើប្រភេទដី ។ ប្រភេទដីនៅកម្ពុជាត្រូវបែងចែកចេញជា ១១ ក្រុម ។ ខាងក្រោមនេះជាតារាងនៃបរិមាណការប្រើប្រាស់ដីតាមប្រភេទក្រុមដីដែលកំណត់ដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា និងនាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ៖

**តារាង ២ ៖ តារាងក្រុមដី និងការប្រើប្រាស់ដី**

| ល.រ | ក្រុមដី   | បទដ្ឋានដី<br>អិន ប៉េ កា<br>(N P K) | បរិមាណដីត្រូវប្រើប្រាស់<br>កំណត់ដោយ CARDI<br>(គក្រ/ហាត) |                               | បរិមាណដីត្រូវប្រើប្រាស់<br>កំណត់ដោយ<br>នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយ<br>(គក្រ/ហាត) |                               | ផ្សេងៗ                          |
|-----|-----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
|     |           |                                    | ឈ្មោះដី                                                 | បរិមាណ                        | ឈ្មោះដី                                                                   | បរិមាណ                        |                                 |
| ០   | ព្រៃខ្មែរ | ២៨-១០-៤០                           | ដេអាប៉េ<br>កាសេអិល<br>អ៊ុយរ៉េ                           | ២១ គក្រ<br>៦៧ គក្រ<br>៥២ គក្រ | ដេអាប៉េ<br>កាសេអិល<br>អ៊ុយរ៉េ                                             | ២៥ គក្រ<br>៦៧ គក្រ<br>៥០ គក្រ | ពូជទំនើប/ប្រពៃណី                |
|     |           | ២០-០៨-០០                           | ដេអាប៉េ<br>អ៊ុយរ៉េ                                      | ១៧ គក្រ<br>៣៧ គក្រ            | ដេអាប៉េ<br>អ៊ុយរ៉េ                                                        | ១៧ គក្រ<br>៣៨ គក្រ            | ពូជទំនើប/ប្រពៃណី                |
| ១   | ប្រទះឡាង  | ៥០-២៣-៣០                           | ដេអាប៉េ<br>កាសេអិល                                      | ៥០ គក្រ<br>៥០ គក្រ            | ដេអាប៉េ<br>កាសេអិល                                                        | ៥០ គក្រ<br>៥០ គក្រ            | ពូជទំនើប/ប្រពៃណី<br>(ករណីមានទឹក |

|   |            |           |                               |                                |                               |                                |                                                 |
|---|------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
|   |            |           | អ៊ុយអ៊ែ                       | ៨៩ គក្រ                        | អ៊ុយអ៊ែ                       | ៩០ គក្រ                        | គ្រប់គ្រាន់                                     |
|   |            | ៣៣-២៣-០០  | ដេអាប៉េ<br>អ៊ុយអ៊ែ            | ៥០ គក្រ<br>៥២ គក្រ             | ដេអាប៉េ<br>អ៊ុយអ៊ែ            | ៥០ គក្រ<br>៥០ គក្រ             | ពូជទំនើប/ប្រពៃណី<br>(ករណីមានទឹក<br>គ្រប់គ្រាន់) |
| ២ | ឡាបានសៀក   |           | ដេអាប៉េ<br>អ៊ុយអ៊ែ            | ១០០ គក្រ<br>៦៥ គក្រ            |                               |                                |                                                 |
| ៣ | អ្នករង     | ៧៥-៣០-៣០  | ដេអាប៉េ<br>កាសេអិល<br>អ៊ុយអ៊ែ | ៦៥ គក្រ<br>៥០ គក្រ<br>១៣៧ គក្រ | ដេអាប៉េ<br>កាសេអិល<br>អ៊ុយអ៊ែ | ៦៥ គក្រ<br>៥០ គក្រ<br>១៤០ គក្រ | ពូជទំនើប                                        |
|   |            | ៧៥-៣០-០០  | ដេអាប៉េ<br>អ៊ុយអ៊ែ            | ៦៥ គក្រ<br>១៧ គក្រ             | ដេអាប៉េ<br>អ៊ុយអ៊ែ            | ៦៥ គក្រ<br>១៤០ គក្រ            | ពូជទំនើប                                        |
|   |            | ៦០-១៧-២០  | ដេអាប៉េ<br>កាសេអិល<br>អ៊ុយអ៊ែ | ៣៧ គក្រ<br>៣៤ គក្រ<br>១១៧ គក្រ | ដេអាប៉េ<br>កាសេអិល<br>អ៊ុយអ៊ែ | ៣៨ គក្រ<br>៣៤ គក្រ<br>១១៧ គក្រ | ពូជប្រពៃណី                                      |
|   |            | ៦០-១៧-០០  | ដេអាប៉េ<br>អ៊ុយអ៊ែ            | ៣៧ គក្រ<br>១១៧ គក្រ            | ដេអាប៉េ<br>អ៊ុយអ៊ែ            | ៣៨ គក្រ<br>១១៧ គក្រ            | ពូជប្រពៃណី                                      |
| ៤ | ក្រគរ      | ១២០-៣៥-០០ | ដេអាប៉េ<br>អ៊ុយអ៊ែ            | ៥៤ គក្រ<br>២៣៩ គក្រ            | ដេអាប៉េ<br>អ៊ុយអ៊ែ            | ៥០ គក្រ<br>១២៥ គក្រ            | ពូជទំនើប/ប្រពៃណី                                |
|   |            | ៦៦-២៣-០០  |                               |                                | ដេអាប៉េ<br>អ៊ុយអ៊ែ            | ៥០ គក្រ<br>១២៤ គក្រ            | ពូជទំនើប/ប្រពៃណី                                |
| ៥ | បាកាន      | ៧៥-៣០-៣០  | ដេអាប៉េ<br>កាសេអិល<br>អ៊ុយអ៊ែ | ៦៥ គក្រ<br>៥០ គក្រ<br>១៣៧ គក្រ | ដេអាប៉េ<br>កាសេអិល<br>អ៊ុយអ៊ែ | ៦៥ គក្រ<br>៥០ គក្រ<br>១៤០ គក្រ | ពូជទំនើប                                        |
|   |            | ៧៥-៣០-០០  | ដេអាប៉េ<br>អ៊ុយអ៊ែ            | ៦៥ គក្រ<br>១៧ គក្រ             | ដេអាប៉េ<br>អ៊ុយអ៊ែ            | ៦៥ គក្រ<br>១៤០ គក្រ            | ពូជទំនើប                                        |
|   |            | ៦០-១៧-២០  | ដេអាប៉េ<br>កាសេអិល<br>អ៊ុយអ៊ែ | ៣៧ គក្រ<br>៣៤ គក្រ<br>១១៧ គក្រ | ដេអាប៉េ<br>កាសេអិល<br>អ៊ុយអ៊ែ | ៣៨ គក្រ<br>៣៤ គក្រ<br>១១៧ គក្រ | ពូជប្រពៃណី                                      |
|   |            | ៦០-១៧-០០  | ដេអាប៉េ<br>អ៊ុយអ៊ែ            | ៣៧ គក្រ<br>១១៧ គក្រ            | ដេអាប៉េ<br>អ៊ុយអ៊ែ            | ៣៨ គក្រ<br>១១៧ គក្រ            | ពូជប្រពៃណី                                      |
| ៦ | ក្បាលពោធិ៍ | ៨០-០០-០០  | អ៊ុយអ៊ែ                       | ១៧៥ គក្រ                       | អ៊ុយអ៊ែ                       | ១៧៥ គក្រ                       | ពូជទំនើប/ប្រពៃណី                                |
| ៧ | កៀនស្វាយ   | ១២០-៣៥-០០ | ដេអាប៉េ<br>អ៊ុយអ៊ែ            | ៥៤ គក្រ<br>២៣៩ គក្រ            | ដេអាប៉េ<br>អ៊ុយអ៊ែ            | ៥០ គក្រ<br>១២៥ គក្រ            | ពូជទំនើប/ប្រពៃណី                                |
|   |            | ៦៦-២៣-០០  |                               |                                | ដេអាប៉េ<br>អ៊ុយអ៊ែ            | ៥០ គក្រ<br>១២៤ គក្រ            | ពូជទំនើប/ប្រពៃណី                                |
| ៨ | ទួលសំរោង   | ៩៨-២៣-០០  | ដេអាប៉េ                       | ៧៦ គក្រ                        | ដេអាប៉េ                       | ៧៥ គក្រ                        | ពូជទំនើប                                        |

|    |          |          |                               |                                |                               |                                |                  |
|----|----------|----------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|
|    |          |          | អ៊ុយវ៉េ                       | ១៨៥ គក្រ                       | អ៊ុយវ៉េ                       | ១៨៥ គក្រ                       |                  |
|    |          | ៦១-២៥-០០ | ដេអាប៉េ<br>អ៊ុយវ៉េ            | ៥២ គក្រ<br>១១៣ គក្រ            | ដេអាប៉េ<br>អ៊ុយវ៉េ            | ៥០ គក្រ<br>១១៣ គក្រ            | ពូជប្រពៃណី       |
| ៩  | គោកត្រប់ | ៧៣-៣៥-៣០ | ដេអាប៉េ<br>កាសេអិល<br>អ៊ុយវ៉េ | ៧៦ គក្រ<br>៥០ គក្រ<br>១២២ គក្រ | ដេអាប៉េ<br>កាសេអិល<br>អ៊ុយវ៉េ | ៧៥ គក្រ<br>៥០ គក្រ<br>១២៥ គក្រ | ពូជទំនើប         |
|    |          | ៦៥-៣០-០០ | ដេអាប៉េ<br>អ៊ុយវ៉េ            | ៦៥ គក្រ<br>១១៥ គក្រ            | ដេអាប៉េ<br>អ៊ុយវ៉េ            | ៦៥ គក្រ<br>១១៥ គក្រ            | ពូជទំនើប         |
|    |          | ៥៨-៣០-២០ | ដេអាប៉េ<br>កាសេអិល<br>អ៊ុយវ៉េ | ៦៧ គក្រ<br>៥០ គក្រ<br>១០០ គក្រ | ដេអាប៉េ<br>កាសេអិល<br>អ៊ុយវ៉េ | ៦៧ គក្រ<br>៥០ គក្រ<br>១០០ គក្រ | ពូជប្រពៃណី       |
|    |          | ៤៩-២៣-០០ | ដេអាប៉េ<br>អ៊ុយវ៉េ            | ៥០ គក្រ<br>៨៧ គក្រ             | ដេអាប៉េ<br>អ៊ុយវ៉េ            | ៥០ គក្រ<br>៨៨ គក្រ             | ពូជប្រពៃណី       |
| ១០ | កំពង់សៀម | ៥០-០០-០០ | អ៊ុយវ៉េ                       | ១០៩ គក្រ                       | អ៊ុយវ៉េ                       | ១១០ គក្រ                       | ពូជទំនើប/ប្រពៃណី |
|    |          | ៩៨-១៨-០០ | ដេអាប៉េ<br>អ៊ុយវ៉េ            | ៣៩ គក្រ<br>១៩៧ គក្រ            | ដេអាប៉េ<br>អ៊ុយវ៉េ            | ៤០ គក្រ<br>២០០ គក្រ            | ពូជទំនើប/ប្រពៃណី |

## ក.១ ការដាក់ជីត្រាប់បាត

សម្រាប់ការផលិតពូជស្រូវ កសិករគប្បីប្រើជីធម្មជាតិសម្រាប់ទ្រាប់បាតឲ្យបានច្រើន (ពី ៣ ទៅ ១០តោនក្នុងផ្ទៃដី ១ហិកតា) ។ ចំពោះជីគីមីវិញ កសិករត្រូវប្រើប្រភេទជី និងបរិមាណប្រើប្រាស់ទៅតាមកម្រិតបទដ្ឋានរបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា (CARDI) ឬនាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ ខាងក្រោមនេះជាតារាងបរិមាណប្រើប្រាស់ជីសម្រាប់ទ្រាប់បាតដែលកម្រិតដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា (CARDI) ៖



តារាង ៣ ៖ តារាងការបាចជីទ្រាប់បាត

| ក្រុមជី        | បរិមាណជីទ្រាប់បាតសម្រាប់ស្រូវវស្សាប្រកាសៈផ្លូវ |                     |                      |
|----------------|------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|                | អ៊ុយរ៉េ (គក្រ/ហត)                              | ដេ អា ប៊ែ (គក្រ/ហត) | ប៉ូតាស្យូម (គក្រ/ហត) |
| ជីព្រៃខ្មែរ    | ១០                                             | ២០                  | ៤០                   |
| ជីប្រទះឡាង     | ១០                                             | ៥០                  | ២៥                   |
| ជីបាកាន ឬអូរុង | ២៥                                             | ២៥                  | ២៥                   |
| ជីទូលសំរោង     | ២៥                                             | ៥០                  | ០                    |
| ជីគោគគ្រប់     | ១០                                             | ៥០                  | ៥០                   |
| ជីកំពង់សៀម     | ៣០                                             | ០                   | ០                    |
| ជីក្រគរ        | ដីលិចទឹករយៈពេលយូរនៅរដូវវស្សា                   |                     |                      |
| ជីក្បាលពោធិ៍   |                                                |                     |                      |

ក.២ ការដាក់ជីបំប៉ន

ការដាក់ជីបំប៉នត្រូវប្រើប្រាស់ឲ្យត្រឹមត្រូវតាមពេលវេលា និងដំណាក់កាលលូតលាស់របស់ស្រូវ ព្រមទាំងបរិមាណនៃការប្រើប្រាស់ជីត្រូវអនុវត្តតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេស ។ ការបាចជីបំប៉នមានពីរលើក ។ លើកទី ១ គឺបន្ទាប់ពីស្លូងបាន ៣០ ថ្ងៃ (ពេលសន្លូងបែកគុម្ព) និងលើកទី ២ ពេលស្រូវម្លូងដើម ឬដាក់កក្កូរ។ ខាងក្រោមនេះជាតារាងបរិមាណប្រើប្រាស់ជីបំប៉នដែលកម្រិតដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា (CARDI) ៖

**តារាង ៤ ៖ តារាងការបាចដីបំប៉ន**

| ក្រុមដី       | បរិមាណដីបំប៉នសម្រាប់ស្រូវវស្សាប្រកាន់រដូវ |                             |
|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|               | អ៊ុយរ៉េ លើកទី ១ (គក្រ/ហិកត)               | អ៊ុយរ៉េ លើកទី ២ (គក្រ/ហិកត) |
| ដីព្រៃខ្មែរ   | ២០                                        | ១០                          |
| ដីប្រទះឡាង    | ២៥                                        | ២៥                          |
| ដីបារកាន ឬអូរ | ៥០                                        | ២៥                          |
| ដីទួលសំរោង    | ២៥                                        | ២៥                          |
| ដីគោគត្រប់    | ៤០                                        | ៣៥                          |
| ដីកំពង់សៀម    | ៤០                                        | ៣០                          |
| ដីក្រគរ       | ដីលិចទឹករយៈពេលយូរនៅរដូវវស្សា              |                             |
| ដីក្បាលពោធិ៍  |                                           |                             |

**ខ. ការគ្រប់គ្រងទឹក**

ទឹកជាធនធានចាំបាច់ក្នុងផលិតកម្មដំណាំស្រូវ។ ទឹកដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ នៅក្នុងដំណើរលូតលាស់របស់ដំណាំដូចជាធ្វើឱ្យរុក្ខជាតិធន់នឹងកំដៅតាមរយៈការបំបាយចំហាយទឹកចេញពីផ្ទៃស្លឹក ជាភ្នាក់ងារក្នុងដំណើរស្នើសំយោគ សម្របសម្រួលដល់ ការស្រូបនិងដឹកជញ្ជូនសារធាតុចិញ្ចឹម។ ម្យ៉ាងវិញទៀតទឹកក្នុងស្រែមានជម្រៅប្រាហាក់ប្រហែលគ្នានៅក្នុងស្រែទាំងមូល វាធ្វើឱ្យស្រូវលូតលាស់បានស្មើគ្នា ផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ និងគ្រាប់ស្រូវមានសំណើមប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ។ ការគ្រប់គ្រងទឹកបានល្អវាក៏ជាកត្តាជួយឱ្យពពួកស្មៅចង្រៃពុំសូវមានការដុះក្នុងស្រែផងដែរ ។

នៅក្នុងដំណាក់កាលបែកគុម្ព គួររក្សាទឹកក្នុងស្រែកំពស់ប្រមាណ ២-៥ ស.ម។ នៅក្នុងកំឡុងពេលនៃវគ្គលូតលាស់ ដើម្បី ឱ្យប្រព័ន្ធឫសរបស់ស្រូវលូតលាស់ល្អ និងបែកគុម្ពបានច្រើន។ ត្រូវជៀសវាងការបង្ហូរទឹកចេញពីស្រែនៅពេលដែលគ្រោះរាំងស្ងួត ទំនងនឹងកើតមានឡើង។ ចាប់ពីដំណាក់កាលកើតកូរដល់ដំណាក់កាលដាក់ទឹកដោះ ស្រូវត្រូវការទឹកជាប្រចាំ ដើម្បីបង្កើន សមាសភាពទិន្នផល។ ដូច្នេះកសិករត្រូវថែរក្សាទឹកក្នុងស្រែយ៉ាងហោចណាស់ពី ៥-១០ ស.ម ជាពិសេសនៅចុងរដូវវស្សាជិតអស់ទឹកភ្លៀង ។

**តារាង ៥ ៖ តារាងកម្រិតទឹកក្នុងស្រែ**

| កម្រិតទឹកក្នុងស្រែ | ដំណាក់កាលលូតលាស់                                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| ១-៥ ស.ម            | សន្លុងទើបស្ទង់                                            |
| ២-៥ ស.ម            | សន្លុងបែកគុម្ព                                            |
| ០ ស.ម              | ស្រូវក្នុងវគ្គលូតលាស់(ទុកឲ្យស្ងួត២ឬ៣ថ្ងៃរួចបញ្ចូលទឹកថ្មី) |
| ៥-១០ ស.ម           | ដំណាក់កាលកកើតកូររហូតដល់ដំណាក់កាលដាក់ទឹកដោះ                |

**ខ. ការគ្រប់គ្រងស្មៅ**

ស្មៅចង្រៃគឺជាប្រភេទរុក្ខជាតិទាំងឡាយណាដែលដុះលាយជាមួយស្រូវ ហើយយើងមិនត្រូវការ។ ស្មៅចង្រៃមានឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់ដំណាំស្រូវដូចជា ប្រជែងស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹម ពន្លឺព្រះអាទិត្យ និងទឹកព្រមទាំងជាជំរកសត្វល្អិតចង្រៃ ជំងឺបំផ្លាញដំណាំស្រូវ និងធ្វើឱ្យគ្រាប់ស្មៅលាយក្នុងគ្រាប់ពូជទៀតផង។ ដើម្បីគ្រប់គ្រងស្មៅចង្រៃប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព កសិករគួរអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រដូចខាងក្រោម៖



រូបភាព ១១ ៖ ការដកស្មៅដោយដៃ

- ត្រូវសំអាតគ្រាប់ស្មៅឱ្យបានស្អាតពីក្នុងគ្រាប់ពូជស្រូវមុននឹងយកទៅដាំ ។
- រៀបចំដីស្រែឱ្យបានស្អាតល្អ (ភ្ជួររាស់ និងហាលដី) និងពង្រាបដីឱ្យបានស្មើល្អ ។
- រក្សាទឹកក្នុងស្រែឱ្យបានជាប្រចាំ ។
- ធ្វើស្មៅយ៉ាងតិចឱ្យបាន ២ ដងក្នុងដំណាក់កាលបែកគុម្ព (១៥ ថ្ងៃក្រោយស្ទង់ និង ៣០ថ្ងៃក្រោយស្ទង់) ។
- សម្រាប់ស្រូវពង្រោះ ការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្លាប់ស្មៅបន្ទាប់ពីព្រោះបាន២-៣ថ្ងៃ និង១៥ថ្ងៃក្រោយព្រោះ គឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត ។



រូបភាព ១២ ៖ ការដកស្មៅដោយប្រើឧបករណ៍

## គ. ការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិត

### គ.១ ទ្រីប

#### លក្ខណៈទូទៅរបស់ទ្រីប

ទ្រីបគឺជាសត្វល្អិតពណ៌ខ្មៅដែលបំផ្លាញដំណាំស្រូវក្នុងវគ្គលូតលាស់ជាពិសេសបំផ្លាញលើសំណាប ។ ពងរបស់វាមានរាងមូលតូចល្អិត ពណ៌ថ្លា និងប្រែជាពណ៌លឿងព្រលិតនៅពេលជិតញាស់។ មេពេញវ័យមានប្រវែងពី ១ ទៅ ២ មម. ពណ៌ត្នោតចាស់ ខ្លះមានស្លាប ឯខ្លះទៀតគ្មានស្លាប។



រូបភាព ១៣ ៖ សត្វទ្រីប

#### ការបំផ្លាញ

- ទ្រីបបំផ្លាញកោសិការង្វីរបស់ដើមដោយបិតជញ្ជក់សារធាតុចិញ្ចឹមពីស្លឹក ដើម និងកូរស្រូវ ។
- ស្លឹកដែលត្រូវបំផ្លាញមានស្នាមខ្សែពណ៌សថ្លា រមួរចូលគ្នា និងឡើងពណ៌លឿងត្នោត។ វាអាចបណ្តាលឲ្យដើមស្រូវក្រិន ឬងាប់តែម្តងនៅពេលមានការបំផ្លាញខ្លាំង។
- ចំពោះកូរស្រូវដែលទទួលរងការបំផ្លាញវាអាចនឹងស្តុក ។ ទ្រីបបំផ្លាញខ្លាំងនៅក្នុងដំណាក់កាលសំណាបបែកគុម្ព និងពេលស្រូវចេញផ្កា ។



រូបភាព ១៤ ៖ ការបំផ្លាញរបស់សត្វទ្រីប

#### កត្តាដែលធ្វើឲ្យសត្វល្អិតលូតលាស់ខ្លាំង

- អាកាសធាតុរាំងស្ងួត ។



- ស្រែគ្មានទឹក ។
- វត្តមានរបស់ស្មៅក្នុងអំបូរក្រាមីនេ ។

### **វិធានការការពារ និងកម្ចាត់**

- ប្រើផេះបាចលើដំណាំស្រូវដែលទទួលរងការបំផ្លាញ ។
- បញ្ចូលទឹកពន្លឺចង្ក្គាលសំណាប/ស្រែ ។
- ប្រើស្បែកមុង ឬក្រមាដែលមានជាតិអំបោះដោយជ្រលក់ទឹកឲ្យសើម រួចអូសលើផ្ទាលចុះឡើងៗរួចពូតសម្លាប់ ។
- បញ្ចូលទឹកក្នុងស្រែរួចប្រើប្រាស់ជីអ៊ុយរ៉េបំប៉ន ។
- ក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរគេប្រើថ្នាំ ឌីមេតូអែត (Dimethoate) ឬឌីណូតេហ្វុយរ៉ាន (Dinotefuran) ។

### **គ.២ ដង្កូវហ្វូង**

#### **លក្ខណៈទូទៅរបស់ដង្កូវហ្វូង**

- កូនដង្កូវមានពណ៌ខៀវ ហើយប្រែជាពណ៌ត្នោត និងមានស្នាមឆ្លុតនៅលើខ្នង ។
- ដឹកខ្សែមានពណ៌ត្នោត និងសំងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងដីជម្រៅប្រមាណ ២ ស.ម ។
- មេអំបៅមានពណ៌ត្នោត និងមានស្នាមអុចៗពណ៌ខ្មៅនៅពីលើស្លាបខាងក្រៅ ឯស្លាបខាងក្នុងមានពណ៌ត្នោតព្រលៃត ។



រូបភាព ១៦ ៖ ដង្កូវហ្វូង

#### **ការបំផ្លាញ**

- ពពួកដង្កូវហ្វូងស៊ីបំផ្លាញស្លឹក និងកាត់កូរស្រូវ ។



#### **កត្តាដែលធ្វើឲ្យលូតលាស់ខ្លាំង**

- វត្តមានរបស់ដំណាំដែលជាជម្រករបស់ដង្កូវហ្វូង ។
- ក្នុងរយៈពេលដែលមានការរាំងស្ងួត ហើយមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅពេលបន្ទាប់ ។

រូបភាព ១៧ ៖ ការបំផ្លាញរបស់ដង្កូវហ្វូង

## ជម្រក

- ដង្កូវហ្វូងវានៅក្នុងដំណាំស្រូវ ពោត និងដំណាំដទៃទៀត ។

## វិធានការការពារ និងកម្ចាត់

- ត្រូវសំអាតស្មៅក្នុងស្រែ និងជុំវិញស្រែឲ្យស្អាត(បំបាត់ជំរក)។
- ធ្វើយ៉ាងណាកុំអោយស្រែជាចម្រើនរយៈពេលយូរពេក។
- កូរដាស់ដី និងកូរមុនស្លុងដោយពន្លឺចម្រើន (ដើម្បីសំលាប់ដីកខ្មៅ និងដង្កូវនៅក្នុងដី)។
- ត្រូវត្រួតពិនិត្យសំណាបឬសន្លុងពេលឃើញមាន វត្តមានមេអំបៅ និងកំចាត់សំបុកពងរបស់វាដោយដៃ។
- ដើម្បីទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញត្រូវដឹករណ្តៅជាចង្កូវជុំវិញថ្នាល ទទឹង៣០-៤០ស.ម និងជំរៅ ៤០-៥០ស.ម រួចយកដោះបាចនៅបាតរណ្តៅដើម្បីកុំអោយដង្កូវឆ្លងកាត់រួច ហើយយើងអាចធ្វើជានាំរាំងពីកៅស៊ូឆ្លាស្ទិច កំពស់ ២០-៣០ ស.ម ព័ទ្ធជុំវិញស្រែបន្ថែមទៀត។
- បើមានទឹកគួរពន្លឺចសំណាប ឬសន្លុងរយៈពេលខ្លី១-២ថ្ងៃ ហើយប្រលែងទាអោយស៊ី។
- សត្រូវធម្មជាតិ:
  - ពេលដង្កូវនៅតូចមាន: ខ្នុតដី អណ្តើកមាស និងពឹងពាង
  - ដង្កូវពេញវ័យមាន: ពូកប៉ារ៉ាស៊ីត បក្សី កង្កែប ត្រី
  - ពង: ស្រីងគោក អណ្តើកមាសកខ្លី
  - មេអំបៅ: ពឹងពាង បង្កែប ត្រី បក្សី
- ករណីធ្ងន់ធ្ងរប្រើថ្នាំពុលកសិកម្ម ឌីយ៉ាហ្ស៊ីណុង (Dianzinon) ឬ ហ្វីនវ៉ាឡីវ៉ែត (Fenvalerate) ឬ គីណាល់ហ្វូស (Quinalfos) ។

### គ.៣ សង្កើចខ្មៅ

#### លក្ខណៈទូទៅរបស់សង្កើចខ្មៅ

- ពងរបស់សង្កើចខ្មៅមានរាងមូលពណ៌ផ្កាឈូក ។
- សត្វពេញវ័យពងនៅលើស្លឹក ឬដើមដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមក្បែរផ្ទៃទឹក ។
- កូនសង្កើចមានពណ៌ត្នោត ឯសង្កើចពេញវ័យមានពណ៌ត្នោត ឬខ្មៅ រលើប ។
- នៅពេលថ្ងៃវាស្ថិតនៅលើផ្នែកខាងក្រោម និងឡើងមកលើដើមផ្នែកខាងលើនៅពេលយប់ ។



រូបភាព ១៨ ៖ សង្កើចខ្មៅ

#### ការបំផ្លាញ

- សត្វពេញវ័យ និងកូនរបស់វាបីតជញ្ជក់រុក្ខជាតិដើម ។
- ពួកសង្កើចខ្មៅចូលចិត្តជញ្ជក់ត្រង់គល់របស់ស្រូវដែលធ្វើឲ្យស្រូវមានសភាពអន់ដើម ។
- ការបំផ្លាញធ្ងន់ធ្ងរអាចបណ្តាលឲ្យស្រូវងាប់ កូនស្រូវស្តុក គ្រាប់មិនពេញល្អ ឬស្តុក និងស្លឹកប្រៃពណ៌ទៅជាពណ៌ត្នោត ឬស្លោកងាប់ ។



រូបភាព ១៩ ៖ ការបំផ្លាញរបស់សង្កើចខ្មៅលើដំណាំស្រូវ

#### កត្តាដែលធ្វើឲ្យលុតលាស់ខ្លាំង

- តំបន់ស្រោចស្រពដោយទឹកភ្លៀង និងតំបន់ដីសើមដែលមានប្រព័ន្ធស្រោចស្រព ។
- ស្រែដែលពុំមានការបង្កូរទឹកចេញ ។
- តំបន់ដែលការដាំដុះស្រូវមិនបានស្រុះគ្នា នៅក្នុងអំឡុង ពេលដូចគ្នា ។

- ស្រែដែលមានដង់ស៊ីតេដើមស្រូវខ្ពស់ហួសហេតុ ។
- ប្រើប្រាស់បរិមាណអាសូតច្រើន ។
- វត្តមានដំណាំដែលអាចជាជម្រកដុះនៅក្បែរ ។
- ក្នុងពេលយប់ដែលមានព្រះច័ន្ទ ។

## ដំណាំជម្រក

ស្រូវ និង ពោត

## វិធានការការពារ និងកម្ចាត់

- ធ្វើអនាម័យស្រែដោយសម្អាតជម្រករបស់វា ។
- ប្រើបរិមាណធុរ្យបានសមស្រប និងមានគុណភាព ។
- ពន្លឺចង្វាក់ស្រែ និងប្រើស្បែកមុងអូសប្រមូលសង្កើចខ្មៅយកមកកម្ទេចចោល ។
- បញ្ចេញទឹកពីក្នុងស្រែព្រោះសង្កើចខ្មៅមិនចូលចិត្តអាកាសធាតុក្តៅ ។
- ប្រមូលសង្កើចខ្មៅរួចបុក និងលាយទឹកបាញ់លើស្រែដែលបំផ្លាញដោយសង្កើចខ្មៅដើម្បីបណ្តេញ ។
- ក្នុងករណីអនុវត្តវិធានការខាងលើមិនមានប្រសិទ្ធភាព គួរប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលកសិកម្មដោយមានការពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញ និងជ្រើសរើសថ្នាំដែលមិនប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សត្វមានប្រយោជន៍សុខភាព និងបរិស្ថាន ។ ថ្នាំដែលអាចប្រើប្រាស់មាន៖ ការបូស៊ីលហ្វាន (Carbosulfan) ។

## គ.៤ មមាចត្នោត

### លក្ខណៈទូទៅរបស់មមាចត្នោត

- ពងមមាចត្នោតមានពណ៌ស ។
- កូនរបស់វាពណ៌ក្រម ប្រភេទក្រម និងពណ៌ត្នោតស្លេក ។
- មមាចត្នោតពេញវ័យមានពីរប្រភេទគឺប្រភេទស្លាបវែង និងស្លាបខ្លី ។
- វាកើតឡើងនៅរដូវប្រាំងច្រើនជាងរដូវវស្សា ។



រូបភាព ២០៖ មមាចត្នោត



- មមាចត្នោតច្រើនកើតនៅក្នុងស្រែដែលស្រោចស្រពដោយទឹកភ្លៀង និងស្រែដែលស្រោចស្រពដោយប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅក្នុងដំណាក់កាលបង្កកំណើត ។

### ការបំផ្លាញ

- មមាចត្នោតពេញវ័យ និងកូនរបស់វាជញ្ជក់ រុក្ខរស់ដើម ស្លឹក និងស្រទបស្លឹកដោយធ្វើឲ្យដើមឡើងពណ៌លឿង ។
- ដើមស្រូវអាចឆេះខ្លោច ឬងាប់នៅពេលមានការបំផ្លាញខ្លាំង ។
- មមាចត្នោតជាភ្នាក់ងារចម្លងវីរុសជំងឺតៀស្មៅ និងជំងឺតៀរញស្លឹក ។
- ដើមដែលទទួលការបំផ្លាញពីមមាចត្នោតងាយទទួលរងពីការកើតជំងឺផ្សេងៗដែលបណ្តាលមកពីមេរោគផ្សិត និងបាក់តេរី ។

### កត្តាដែលធ្វើឲ្យលូតលាស់ខ្លាំង

- តំបន់ស្រោចស្រពដោយទឹកភ្លៀង និងតំបន់ដីសើមដែលមានប្រព័ន្ធស្រោចស្រព ។
- ស្រែមានទឹកដក់ជាប្រចាំ ។
- ស្រែដែលមានម្លប់បាំង និងមានសំណើមខ្ពស់ ។
- ស្រែដែលមានដងស៊ីតេដើមស្រូវខ្ពស់ហួសហេតុ ។
- ប្រើប្រាស់បរិមាណអាសូតច្រើន ។
- ការប្រញាប់បាញ់ថ្នាំកសិកម្មនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការលូតលាស់របស់ស្រូវ ។



រូបភាព ២១ ៖ ការបំផ្លាញរបស់មមាចត្នោតលើដំណាំស្រូវ

## ដំណាច់ប្រភេទ

ស្រូវ


### វិធានការការពារ និងកម្ចាត់

- គួរបៀបចំថ្នាលសំណាបឆ្ងាយពីអំពូលភ្លើងអគ្គីសនី ។
- ប្រើពូជធន់នឹងមមាចត្នោត ។
- ដាំដុះឲ្យបានស្របពេលវេលា ។
- ការដាំដុះចៀសវាងកុំឲ្យចំពេលមមាចត្នោតបំលាស់ទី ។
- ធ្វើអនាម័យស្រែដោយសម្អាតស្មៅចង្រៃ និងជម្រករបស់វាតាមភ្លើស្រែ ។
- ប្រើប្រាស់ដីឲ្យបានសមស្រប និងមានគុណភាព ចៀសវាងការប្រើអាសូតច្រើន
- ពន្លឺចង្វាក់សំណាប និងយកស្បែកមុងអូសប្រមូលយកមមាចត្នោតកម្ទេចចោល ។
- ប្រើអន្ទាក់ភ្លើងដើម្បីពិនិត្យប្រជាករមមាចត្នោត រួចកម្ចាត់វាចោល ។
- ក្នុងករណីអនុវត្តវិធានការខាងលើមិនមានប្រសិទ្ធភាព គួរប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលកសិកម្មដោយមានការពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញ និងជ្រើសរើសថ្នាំដែលមិនប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សត្វមានប្រយោជន៍សុខភាព និងបរិស្ថាន ។ ថ្នាំដែលអាចប្រើប្រាស់បានមាន៖ ប៊ុយប្រូហ្វេស៊ីន (Buprofezin) ឌីណូតេហ្វូរ៉ាន (Dinotefuran) អេតូហ្វីនប្រុក (Etofenprox) ហ្វេណូប៊ុយកាប (Fenobucarb) ហ្វីប្រូនីល (Fipronil) អ៊ីមីដាក្រូប្រី (Imidacloprid) ។

### គ.៥ ដង្កូវមូរស្លឹក

#### លក្ខណៈទូទៅរបស់ដង្កូវមូរស្លឹក

- ដំណាក់កាលដំបូងដង្កូវមានពណ៌លឿង បន្ទាប់មកមានពណ៌លឿងលាយបៃតងនៅពេលវាធំ និងមានប្រវែងពី ១២ ទៅ ២៥ មម. ។
- ដង្កូវតែមួយអាចមូរស្លឹកបានពី ២ ទៅ ៤ ស្លឹក ។
- ដឹកខ្សៀរបស់វាមានប្រវែងពី ៩ មម. ទៅ ១២ មម. ហើយសំងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងស្លឹកដែលវាបានមូរចូលគ្នា ។



រូបភាព ២២ ៖ មេអំបៅ និងដង្កូវមូរស្លឹក

- មេអំបៅមានពណ៌លឿងចាស់ តែវាតែងបង្ហាញខ្លួននៅពេលល្ងាច និងវាពងនៅពេលយប់ ។



### ការបំផ្លាញ

- ដង្កូវមូរស្លឹកបញ្ចូលគ្នាធ្វើសំបុក និងសំងំលាក់ខ្លួននៅផ្នែកខាងក្នុង ហើយស៊ីបំផ្លាញកោសិការស្លឹកដែលធ្វើឲ្យស្លឹកដែលវាស៊ីបំផ្លាញមានស្នាមឆ្គុតថ្លា ។

### កត្តាដែលធ្វើឲ្យលូតលាស់ខ្លាំង

រូបភាព ២៣ ៖ ការបំផ្លាញរបស់ដង្កូវមូរស្លឹក

- ប្រើប្រាស់ដីច្រើនពេក
- វាស្រែដែលមានម្លប់បាំង និងវាលស្រែដែលមានសំណើមខ្ពស់ ។
- ស្រែមានស្មៅដុះច្រើន ។

### ដំណាំជម្រក

ស្រូវ ពោត ដូង ចេក អំពៅ ថ្នាំជក់ និងដំណាំដទៃៗទៀត ។

### វិធានការការពារ និងកម្ចាត់

- ស្ទង់ឲ្យឆ្ងាយពីម្លប់ និងកុំស្ទង់ញឹកពេក ។
- សម្អាតជម្រកមេអំបៅក្នុងស្រែ និងតាមភ្លើងឲ្យបានស្អាត ។
- ប្រើប្រាស់ដីឲ្យបានសមស្រប និងមានគុណភាព ចៀសវាងការប្រើអាសូតច្រើន ។
- ប្រើបន្លាស្អិត ឬបន្លាពាក់ ឬឈើផ្សេងៗដែលបន្លា ឬរំពាត់មកវាសលើស្លឹកស្រូវនៅពេលថ្ងៃក្តៅខ្លាំង ។
- ថែរក្សាសត្វមានប្រយោជន៍នៅក្នុងស្រែដើម្បីឲ្យវាស៊ីពពូកដង្កូវមូរស្លឹកជាអាហារ ។
- ក្នុងករណីអនុវត្តវិធានការខាងលើមិនមានប្រសិទ្ធភាព គួរប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលកសិកម្មដោយមានការពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញ និងជ្រើសរើសថ្នាំដែលមិនប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សត្វមានប្រយោជន៍សុខភាព និងបរិស្ថាន ។ ថ្នាំដែលអាចប្រើប្រាស់បានមាន៖ កាតាប (Cartap) ក្លរ៉ានីត្រានីលីប្រូល (Chlorantaniiprole) ឌីយ៉ាហ្ស៊ីណុង (Diazinon) ហ្វេនីត្រូថ្នុង (Fenitrothion) ហ្វីប្រូនីល (Fipronil) គីណាល់ហ្វូស (Quinalphos) ។



**គ.៦ ស្រីជញ្ជក់ទឹកដោះ**  
**លក្ខណៈទូទៅស្រីជញ្ជក់ទឹកដោះ**

- ពងវាមានរាងមូលទ្រវែង មានពណ៌ក្រហមក្រមៅ និងក្លឹរលោង ។
- កូនស្រីមានពណ៌ស្លេក និងមានអង្គតែនវែង តែក្រោយមកវាប្រែទៅជាពណ៌លឿងលាយបៃតង។
- ស្រីពេញវ័យមានជើងវែង និងមានដងខ្លួនវែងស្តើង ។
- វាចេញរកស៊ីនៅពេលព្រឹកព្រលឹម និងពេលល្ងាច ។



រូបភាព ២៤ ៖ ស្រីជញ្ជក់ទឹកដោះ



រូបភាព ២៥ ៖ ពងស្រីជញ្ជក់ទឹកដោះ

**ការបំផ្លាញ**

- ស្រីបីតជញ្ជក់ទឹកដោះពីគ្រាប់ស្រូវដោយធ្វើឲ្យគ្រាប់ស្រូវមានទំហំតូច មានស្នាមអុច និងទម្រង់មិនពេញលេញ ឬខូចតែម្តង ។



រូបភាព ២៦ ៖ ការបំផ្លាញរបស់ស្រីជញ្ជក់ទឹកដោះ

**កត្តាដែលធ្វើឲ្យលូតលាស់ខ្លាំង**

- ការដាំដុះ/ស្វែងមិនស្រុះគ្នាក្នុងពេលតែមួយ ។
- អាកាសធាតុក្តៅ មេឃស្រទំ និងមានភ្លៀងរលឹម ។
- ដំណាក់កាលស្រូវចាប់ផ្តើមផ្កា ដល់ដំណាក់កាលស្រូវដាក់ទឹកដោះ ។

**ដំណាំជម្រក**

ស្រូវ ត្របែក ស្វាយ តែ និងដំណាំដទៃទៀត


## វិធានការការពារ និងកម្ចាត់

- ធ្វើអនាម័យស្រែ ដោយសម្អាតជម្រករបស់វាឲ្យបានស្អាត ។
- ប្រើប្រាស់សាច់ក្រអូបលាយជាមួយទឹក រួចបាញ់លើស្រែដែលបំផ្លាញដោយស្រឹងដង្កូវកំទេចដោះ។
- ប្រើប្រាស់ប្រហុកខាងក្រៅស្រែដើម្បីទាក់ទាញសត្វ ស្រឹងដង្កូវកំទេចដោះ ។
- ប្រើស្បែកមុងអូសស្រឹងរួចបុកលាយជាមួយទឹករួចបាញ់លើស្រែទាំងមូលដើម្បីបណ្តេញ ។
- ក្នុងករណីអនុវត្តវិធានការខាងលើមិនមានប្រសិទ្ធភាព គួរប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលកសិកម្មដោយមានការពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញ និងជ្រើសរើសថ្នាំដែលមិនប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សត្វមានប្រយោជន៍សុខភាព និងបរិស្ថាន ។ ថ្នាំដែលអាចប្រើប្រាស់បានមាន៖ អេតូហ្វីនប្រុក (Etofenprox) ហ្វេនីត្រូថ្នុង (Fenitrothion) ។

## គ.៧ ដង្កូវបំពង់កាត់ស្លឹក

### លក្ខណៈទូទៅដង្កូវបំពង់កាត់ស្លឹក

- មេអំបៅពងក្រោមស្លឹក ។
- ដង្កូវមានពណ៌បៃតងព្រលែត និងក្បាលវាមានពណ៌ត្នោតស្រាល ។
- ដឹកខ្សៀមានពណ៌លឿងស្រាល និងប្រែទៅជាពណ៌ប្រាក់នៅពេលវាចាស់ ។
- មេអំបៅមានពណ៌ស និងមានស្នាមក្រវិចក្រវៀនពណ៌ត្នោតស្រាល ។



រូបភាព ២៧ ៖ មេអំបៅ ដឹកខ្សៀ និងដង្កូវបំពង់កាត់ស្លឹក

## ការបំផ្លាញ

- ដង្កូវបំផ្លាញចុងស្លឹក និងមូរស្លឹកដែលវាកាត់ជាបំពង់តូចៗ ។
- ស្លឹកដែលវាកាត់មានសណ្ឋានដូចជាកាំដណ្តើរ ។



រូបភាព ២៨ ៖ ការបំផ្លាញរបស់ដង្កូវបំពង់កាត់ស្លឹក

## កត្តាដែលធ្វើឱ្យលូតលាស់ខ្លាំង

- ស្រែដែលដក់ទឹក ។
- ស្ទឹងសំណាបខ្លី ។
- តំបន់ដីសើម និងមជ្ឈដ្ឋានដែលមានប្រព័ន្ធស្រោចស្រព ។

## ដំណាច់ប្រភេទ

ស្រូវ ពពួកកក់ និងដំណាំដទៃទៀត ។

## វិធានការការពារ និងកម្ចាត់

- ប្រើថ្នាំលេចកាត់បន្ថយការបំផ្លាញនៅដំណាក់កាលសំណាប ។
- បញ្ចូលទឹកក្នុងស្រែឲ្យលិចសន្ធឹងលើបង្កៀប រួចប្រើស្បែកមុងអូសដង្កូវបំបាត់កាត់ស្លឹក ចោល ។
- បង្កូតទឹកចេញពីស្រែដោយត្រងយកដង្កូវមកកំទេចចោល ហើយហាលចោល ២ ឬ ៣ថ្ងៃសឹម បញ្ចូលទឹកថ្មីវិញ ។
- បាចផេះលើស្រែ ឬត្រង់ចំណុចដែលបំផ្លាញ ។
- ព្រលែងសត្វទាឲ្យចូលក្នុងស្រែដើម្បីឲ្យស៊ីដង្កូវដែលអណ្តែតលើទឹក ។
- ក្នុងករណីអនុវត្តវិធានការខាងលើមិនមានប្រសិទ្ធភាព គួរប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលកសិកម្មដោយមានការពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញ និងជ្រើសរើសថ្នាំដែលមិនប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សត្វមានប្រយោជន៍ សុខភាព និងបរិស្ថាន ។ ថ្នាំដែលអាចប្រើប្រាស់បានមាន៖ ឌីយ៉ាហ្ស៊ីណុង (Diazinon) ។

## គ.៨ ដង្កូវស្ទឹងដើម

### លក្ខណៈទូទៅរបស់ដង្កូវស្ទឹងដើម

- ពងមានពណ៌សរាងសំប៉ែតទ្រវែង ដែលគ្របដណ្តប់ដោយរោមពណ៌ត្នោតរបស់មេអំបៅញី ។
- ដង្កូវមានពណ៌លឿង គ្មានរោម និងក្បាលមានពណ៌ទឹកក្រូច ។
- ដឹកខ្សៀសំណំខ្លួនក្នុងដើមស្រូវ ។
- មេអំបៅញីមានពណ៌លឿងស្រាល និងមានស្នាមអុចពណ៌ខ្មៅនៅលើស្លាបនីមួយៗ



រូបភាព ២៩ ៖ ដង្កូវស្ទឹងដើម

របស់វា ។

- មេអំបៅឈ្មោលមានមាឌតូច ជាងមេអំបៅញី និងមានពណ៌ លឿងចាស់ និងមានស្នាម អុចខ្មៅ ២ នៅលើស្លាប នីមួយៗរបស់វា ។



រូបភាព ៣០ ៖ មេអំបៅឈ្មោល

រូបភាព ៣១ ៖ មេអំបៅញី

### ការបំផ្លាញ

- ធ្វើឲ្យបណ្តាលស្រូវងាប់ ។
- ធ្វើឲ្យកូរស្រូវស្អាត ។

### កត្តាដែលធ្វើឲ្យលូតលាស់ខ្លាំង

- ស្រែស្ទឹងក្រោយគេ ។
- វត្តមានគល់ជញ្ជាំងនៅក្នុងស្រែ ។



### ដំណាំជម្រក

ស្រូវ ពោត និងដំណាំដទៃទៀត ។

រូបភាព ៣២ ៖ ការបំផ្លាញរបស់ដង្កូវស្ទឹងដើម

### វិធានការការពារ និងកម្ចាត់

- ប្រើពូជស្រូវដែលមានអាយុកាលខ្លី ។
- គួរលប់គល់ជញ្ជាំងភ្លាមបន្ទាប់ពីច្រូតកាត់រួច ។
- កម្ចាត់សំបុក ពង នៅពេលដកសំណាប និងពេលយកសំណាបទៅស្ទឹង ។
- ប្រើប្រាស់ដីឲ្យបានសមស្រប និងមានគុណភាព ។
- ក្នុងករណីអនុវត្តវិធានការខាងលើមិនមានប្រសិទ្ធភាព គួរប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលកសិកម្មដោយមានការ ពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញ និងជ្រើសរើសថ្នាំដែលមិនប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សត្វមានប្រយោជន៍ សុខ ភាព និង បរិស្ថាន ។ ថ្នាំដែលអាចប្រើប្រាស់បានមាន៖ កាតាប (Cartap) ក្លរ៉ានីត្រានីលីប្រូល (Chlorantaniliprole) ឌីយ៉ាហ្ស៊ីណុង (Diazinon) ឌីណូតេហ្វីយ៉ូរ៉ាន (Dinotefuran) ហ្វីប្រូនីល (Fipronil) ។



## គ.៩ កណ្តុរ

### លក្ខណៈទូទៅរបស់សត្វកណ្តុរ

- កណ្តុរជាសត្វមួយដែលមានពណ៌ប្រផេះ ដងខ្លួនមូលទ្រវែងគ្របដណ្តប់ដោយរោម ក្បាលរាង សាជីមានជើង៤ ម្រាម១៨ (ជើងមុខមានម្រាមម្ខាង ៤ និងជើងក្រោយមានម្រាមម្ខាង៥)។
- មានភ្នែក២មិនពូកែមើលទេ មានច្រមុះ ពូកែស្រង់ ក្លិន ត្រចៀករាងវែងក្នុងការស្តាប់ ពុកមាត់ និងរោមប្រែងសំរាប់នាំផ្លូវពេលផ្លាស់ទី។ ធ្មេញមុខមាន៤(លើ២ ក្រោម២)រាងមុតដូចមុខ ពន្លាក។
- កណ្តុរចូលចិត្តរស់នៅក្នុងរូងដីដំបូក តាមកំប្លុកព្រៃ គុម្ពឫស្សី តាមភ្លឺស្រែ ដីទួល លើដើមឈើ លើផ្ទះ។ល។



រូបភាព ៣៣ ៖ កណ្តុរ

### ការបំផ្លាញ

- កណ្តុរអាចបំផ្លាញដំណាំស្រូវចាប់តាំងពីដំណាក់កាលសំណាបរហូតដល់ដំណាក់កាលទុំ ។
- បំផ្លាញខ្លាំងនៅដំណាក់កាលស្រូវដើម។
- ការបំផ្លាញដោយកាត់ដើមផ្នែកជិតគល់មាន ស្នាមរាងបញ្ចិត ហើយស៊ីផ្នែកខ្លីៗនៃដើម និងកូរខ្លីនៅក្នុងកំដើមស្រូវ បើនៅដំណាក់កាលទុំវា កាត់កូរស្រូវទំលាក់រួចស៊ីគ្រាប់។
- កណ្តុរប្រើស៊ីបំផ្លាញនៅក្នុងស្រែ ដែលគោក ឬស្រែដែលមាន សណ្ឋានដីមិនរៀបស្មើ ឬកាច់សំបុកនៅក្នុងស្រែតែម្តង ហើយក្រៅពីនេះគឺស្រែនៅជិត កំប្លុក ព្រៃ គុម្ពឫស្សី ដំបូក ឬជិតភូមិ។
- ចំពោះស្រូវស្រាលតែងតែជួបប្រទះការបំផ្លាញខ្លាំង។
- កណ្តុរតែងតែធ្វើសកម្មភាពបំផ្លាញនៅពេលយប់ ដោយចាប់ផ្តើមការបំផ្លាញពីផ្នែកកណ្តាលស្រែ រួចរីករាលដាលមកខាង ។
- ក្នុងករណីមានការបំផ្លាញធ្ងន់ធ្ងរ បើមិនបានចាត់វិធានការ ទប់ស្កាត់ និងកំចាត់ទាន់ពេលវេលាទេ អាចបណ្តាលអោយបាត់បង់ទិន្នផលស្ទើរតែ១០០%។



## វិធានការការពារ និងកម្ចាត់

- ត្រូវបំផ្លាញជម្រករបស់វា និងកម្ចាត់កណ្តុរជា សហគមន៍តាមរយៈទឹកកម្ចាត់កណ្តុរ ។
- ដាក់បង់បូស្សី ឬទុយយោក្សរក្សីស្រែដើម្បីប្រមូលកណ្តុរ ។
- ប្រើអង្កបចាប់កណ្តុរ ។
- ប្រើកៅស៊ូឆ្នាស្ទឹកធ្វើជាចាំជុំវិញស្រែ ។
- ដាក់នុយបំពុល ។
- ប្រើខ្សែលូស និងអាគុយឆក់នៅពេលយប់ ។
- រក្សាពូកប្រដាក់ទំរង់ដូចជា ពស់ ខ្លែងស្រាកទីទុយ ។ល។

## ឃ. ជំងឺ

### ឃ.១ ជំងឺឆ្នាស

#### ការពិពណ៌នា

- ជំងឺនេះវាបង្កដោយមេរោគផ្សិត ពីរីគូឡារាត្រីសៀ (Pyricularia grisea) ។
- កើតនៅលើស្លឹក ៖ មានស្នាមចំណុចពណ៌ ត្នោតប្រផេះលេចឡើងនៅលើផ្ទៃស្លឹក ស្នាមចំណុចទាំងនោះមានរាងពងក្រពើ ដែលផ្នែកកណ្តាលមានពណ៌ប្រផេះ ហើយជាយសងខាងមានពណ៌ត្នោត ។ ក្នុង ដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរស្លឹកឡើងក្រៀមស្លឹក ។
- កើតនៅលើទងស្លឹក៖ ដំបៅកើតឡើងនៅ ត្រង់មុំតំណស្លឹក និងស្រទបស្លឹក ។ ករណី ធ្ងន់ធ្ងរវាបណ្តាលឲ្យងាប់ស្លឹក ។
- កើតនៅលើថ្នាំងរបស់ដើម៖ ថ្នាំងកើតជំងឺ វាមានពណ៌ក្រមៅ និងក្រៀមស្លឹក ។
- កើតនៅលើទងគ្រាប់៖ ទងគ្រាប់មានជំងឺ នេះមានពណ៌ស និងងាប់មុនពេលដាក់ គ្រាប់ ។
- កើតនៅកូរស្រូវ៖ នៅត្រង់ថ្នាំងនៃកូរស្រូវមានពណ៌ក្រមៅស្លឹក ក្រៀមស្លឹក ។ កូរស្រូវកើតជំងឺនេះ មានគ្រាប់ស្តុក ឬមានគ្រាប់មិនពេញ ។



រូបភាព ៣៤ ៖ រោគសញ្ញាជំងឺឆ្នាសលើស្លឹក

### កត្តាដែលបង្កឱ្យដំណើរការឡើង

- ប្រើប្រាស់គ្រាប់ពូជដែលមានជំងឺ ឬឆ្លង ជំងឺ។
- ប្រើប្រាស់ដីអាសូតហួសកម្រិត ។
- ខ្វះខាតបាក់ ឬខ្វះពន្លឺថ្ងៃជះចូលឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅតាមដើម ។
- ភ្លៀងនៅពេលថ្ងៃ ហើយសំណើមប្រចាំថ្ងៃ មានកម្រិតខ្ពស់ ។
- មេឃស្រទំ ភ្លៀងធ្លាក់ញឹកញាប់ និង រលឹមជាប្រចាំ ។



រូបភាព ៣៥ ៖ រោគសញ្ញាជំងឺប្លាស់លើដើម

### វិធានការការពារ និងកម្ចាត់

- ប្រើប្រាស់ពូជដែលអាចទប់ទល់ការរោគគ្បាត របស់ផ្សិត ព្រោះវាមានប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ច ខ្ពស់ ។
- ធ្វើការដាំដុះឲ្យបានទាន់ពេលវេលា ឬឲ្យបានដើមរដូវ និងចៀសវាងសាបក្រាស់ ឬស្លុងញឹកពេក។
- ស្ទង់ជាជួរដើម្បីឲ្យពន្លឺថ្ងៃ និងខ្យល់ចេញចូល បានល្អ ។
- ចៀសវាងការប្រើដីហួសកម្រិត ជាពិសេសដីអាសូត ។
- បំប៉នដីឲ្យត្រូវតាមដំណាក់កាល និងបរិមាណកំណត់
- ក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរប្រើថ្នាំកំចាត់ផ្សិត បេណូមីល (Benomyl) ឬ កាបិនដាហ្ស៊ីម (Carbendazim) ឬ អ៊ីសូប្រូត្យូឡាន (Isoprothiolane) ឬ ទ្រីស៊ីក្លាហ្សូល (Tricyclazole)។



រូបភាព ៣៦ ៖ រោគសញ្ញាជំងឺប្លាស់លើកង្វះ

**ឃ.២ ជំងឺរោគស្លឹកបង្កដោយបាក់តេរី  
ការពិពណ៌នា**

- ជំងឺនេះបង្កដោយបាក់តេរី សានហ្សូម៉ូណាស អូរីហ្សេប៉េដេ.អូរីហ្សេ (Xanthomonas Oryzae pv.oryzae) ។
- ស្រូវកើតជំងឺនេះមានស្នាមពណ៌លឿងនៅតាមបណ្តោយស្លឹក ។
- ស្លឹកប្រែជាក្រៀមស្វិតពេលស្នាមនេះរីករាលដាលកាន់តែធំ ។
- នៅពេលព្រលឹមមានសន្សើមធ្លាក់ច្រើនមានដក់ទឹកល្អក់ពណ៌លឿងស្រអាប់ត្រង់លើស្នាមដំបៅ ។



រូបភាព ៣៧ ៖ រោគសញ្ញាជំងឺរោគស្លឹក

**ការបំផ្លាញ**

ធ្វើឲ្យស្លឹកស្វិតងាប់ ។



រូបភាព ៣៨ ៖ រោគសញ្ញាបំផ្លាញរបស់ជំងឺរោគស្លឹកនៅដំណាក់កាលដាក់ម្សៅ

**កត្តាដែលបង្កឲ្យជំងឺកើតឡើង**

- វត្តមានរបស់ស្មៅនៅក្នុងស្រែ ឬជុំវិញស្រែ ។
- វត្តមានគល់ជញ្ជាំងដែលមានជំងឺ ។
- វត្តមានមេរោគនៅក្នុងស្រែ និងនៅក្នុងប្រឡាយទឹក ។
- អាកាសធាតុក្តៅ សំណើមខ្ពស់ ភ្លៀង និងទឹកក្នុងស្រែច្រើន ។
- ប្រើដីច្រើនហួសកម្រិត ។



រូបភាព ៣៩ ៖ រោគសញ្ញាបំផ្លាញរបស់ជំងឺរោគស្លឹក


## វិធានការការពារ និងកម្ចាត់

- ប្រើពូជដែលធន់នឹងជំងឺ ។
- ប្រើប្រាស់ទឹកក្ដៅដើម្បីសម្អាតគ្រាប់ពូជ និងសម្លាប់មេរោគមិននឹងយកទៅ សាប ។
- ប្រើប្រាស់ដីឲ្យបានសមស្រប និងមានគុណភាព ។
- ចៀសវាងការប្រើដីអាសូតច្រើនហួសកម្រិត ។
- ស្ទង់កុំឲ្យញឹកពេក ។
- គួរហាលដីបន្ទាប់ពីច្រូតកាត់រួច ។
- ដកមូរស្រូវ និងគល់ជញ្ជាំងចេញឲ្យអស់ពីស្រែដើម្បីបំផ្លាញប្រភពជំងឺ ។

## ឃ.៣ ជំងឺឆ្លុះស្លឹក

### ការពិពណ៌នា

- ជំងឺនេះបង្កដោយបាក់តេរី សានហ្សូម្យី ណាសអូរីហ្សែប៉េដេអូរីហ្ស៊ីកូឡា (*Xanthomonas Oryzae* pv. *Oryzicola*) ។
- ពេលស្រូវទើបកើតជំងឺនេះស្លឹកប្រែជាពណ៌បៃតងចាស់ និងមានស្នាមជាំនៅតាមចន្លោះសរសៃស្លឹក ។
- នៅពេលស្នាមជាំរីកកាន់តែធំ ស្លឹកប្រែជាពណ៌លឿងប្រផេះ និងថ្លាឆ្មុះ ហើយបន្ទាប់មកវាប្រែទៅជាពណ៌ត្នោត ឬប្រផេះ ហើយក្រៀមស្ងួត ។
- ជំងឺនេះវាច្រើនកើតនៅពេលស្រូវបែកគុម្ព រហូតដល់ចេញកូរ ។



### ការបំប្លាញ

- ធ្វើឲ្យស្លឹកមានពណ៌ត្នោត និងងាប់ ។
- ធ្វើឲ្យទិន្នផលធ្លាក់ចុះនៅពេលមានការបំផ្លាញខ្លាំង ។

រូបភាព ៤០ ៖ រោគសញ្ញាជំងឺឆ្លុះស្លឹក

**កត្តាដែលបង្កឱ្យជំងឺកើតឡើង**

- វត្តមានបាក់តេរីនៅលើស្លឹក ក្នុងទឹក ឬនៅលើកាកសំណល់រុក្ខជាតិក្នុងស្រែក្រោយពេលច្រូតកាត់ ។
- សំណើម និងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ។

**វិធានការការពារ និងកម្ចាត់**

- ប្រើពូជដែលធន់នឹងជំងឺ ។
- ប្រើប្រាស់ទឹកក្តៅដើម្បីសម្អាតគ្រាប់ពូជ និងសម្លាប់មេរោគមិននឹងយកទៅសាប ។
- ប្រើប្រាស់ដីឲ្យបានសមស្រប និងមានគុណភាព ។
- ចៀសវាងការប្រើដីអាសូតច្រើនហួសកម្រិត ។
- ស្ទង់កុំឲ្យញឹកពេក ។
- គួរហាលដីបន្ទាប់ពីច្រូតកាត់រួច ។
- ដកមូរស្រូវ និងគល់ជញ្ជាំងចេញឲ្យអស់ពីស្រែដើម្បីបំផ្លាញប្រភពជំងឺ ។
- ធ្វើចង្កូរបណ្តោះទឹកជាពិសេសនៅដំណាក់កាលសំណាប ។

**ឃ.៤ ជំងឺរោគស្រទបស្លឹក**

**ការពិពណ៌នា**

- ជំងឺនេះបង្កឡើងដោយមេរោគផ្សិត រីហ្សូកតូនា សូឡានី (Rhizoctonia solani) ។
- រោគសញ្ញាដំបូងនៃជំងឺនេះគឺស្នាមដំបៅលើស្រទបស្លឹកក្បែរទងស្លឹក ។
- ស្នាមមានរាងពងក្រពើ ឬរាងមូលទ្រវែង ពណ៌បៃតងលាយប្រផេះដែលមានសណ្ឋានដូចជាស្នាមជាំ ។
- ស្នាមនេះរីកធំមានពណ៌ប្រផេះនៅផ្នែកកណ្តាល និងមានជាយពណ៌ត្នោត ឬ ត្នោតក្រមៅ ។
- ដំបៅរីករាលដាលដល់ស្លឹកដោយមានស្នាមពណ៌ត្នោតស្រាល និងមានជាយពណ៌ត្នោតចាស់ ។





រូបភាព ៤១ ៖ រោគសញ្ញាជំងឺរលាកស្រទាប់ស្លឹក

### ការបំប្លាញ

- បង្កើតជាស្នាមដំបៅនៅលើដើមស្លឹក និងធ្វើឲ្យស្លឹកងាប់ ។
- ធ្វើឲ្យស្រូវមិនមានផ្លែ ។

### កត្តាដែលបង្កឲ្យជំងឺកើតឡើង

- វត្តមានរបស់មេរោគនៅក្នុងដី ។
- សំណើមខ្ពស់ ។
- សីតុណ្ហភាពពី ២៨ ទៅ ៣២ អង្សាសេ ។
- ប្រើដីអាសូតច្រើនហួសកម្រិត ។
- វត្តមានរបស់មេរោគអណ្តែតតាមទឹក ។



រូបភាព ៤២ ៖ រោគសញ្ញានៃការបំប្លាញរបស់ជំងឺរលាកស្រទាប់ស្លឹក



## វិធានការការពារ និងកម្ចាត់

- ស្ទង់កុំញឹកពេក ។
- ប្រើដីអាសូតតាមតម្រូវការរបស់ដំណាំ ។
- សម្អាតគល់ជញ្ជាំងដែលកើតជំងឺ និងស្មៅចង្រៃចេញពីក្នុងស្រែ ។
- ប្រើថ្នាំសម្លាប់ផ្សិតដោយពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញ ។ ថ្នាំដែលប្រើមាន៖ បេណូមីល (Benomyl) ការបិដាហ្ស៊ីម (Carbendazim) អ៊ីប្រូដ្យូន (Iprodione) ផែនស៊ីគុយរ៉ុង (Pecycuron) ប្រូពីកូណាហ្សូល (Propiconazole) ទ្រីស៊ីក្លាហ្សូល (Triciclazole) + ប្រូពីកូណាហ្សូល (Propconazole) វ៉ាលីដាមីស៊ីន (Validamycin) ។

## ឃ.៥ ជំងឺទង់ត្រោ

### ការពិពណ៌នា

- ជំងឺនេះចម្លងដោយពពួកមមាច ជាពិសេសសត្វមមាចខៀវ ។
- ស្រូវដែលកើតជំងឺនេះបែកគុម្ពតិច និងស្លឹកប្រែជាពណ៌លឿងនៅខាងចុង និងស្លឹកមានស្នាមអុចៗពណ៌ច្រេះ ។
- ជូនកាលកូរស្រូវមិនអាចលេចចេញមកក្រៅទាំងស្រុង ។ ចំពោះកូរដែលចេញមកក្រៅគ្រាប់វាស្ងួត ឬមិនពេញ ។



រូបភាព ៤៣ ៖ រោគសញ្ញានៃជំងឺទង់ត្រោ

### ការបំបាត់

- ស្រូវបែកគុម្ពតិច ។
- ស្រូវមិនអាចចេញផ្កា និងផ្តល់ផ្លែ ។



រូបភាព ៤៤ ៖ រោគសញ្ញាបំបាត់របស់ជំងឺទង់ត្រោ

## កត្តាដែលបង្កឱ្យដំណើរការឡើង

- វត្តមានភ្នាក់ងារចម្លងជំងឺ ។
- ភាពមិនធន់ទ្រាំរបស់ស្រូវ ។

## វិធានការការពារ និងកម្ចាត់

- ប្រើប្រាស់ពូជដែលធន់នឹងជំងឺ ។
- គួរហាលដីបន្ទាប់ពីច្រូតកាត់រួច ដើម្បីបំផ្លាញប្រភព និងភ្នាក់ងារចម្លងជំងឺ ។
- ដកដើមស្រូវដែលមានជំងឺចេញពីក្នុងស្រែ និងដុតវាចោល ។
- កម្ចាត់សត្វល្អិតដែលជាភ្នាក់ងារចម្លងជំងឺ ជាពិសេសពពួកមមាចខៀវ ។

## ឃ.៦ ជំងឺត្បាញស្មៅ

### ការពិពណ៌នា

- ជំងឺត្បាញស្មៅត្រូវបានចម្លងដោយសត្វមមាចភ្នែក ។ ក្រោយពីឆ្លងជំងឺនេះបានប្រមាណពី ១០ ទៅ ១២ថ្ងៃ រោគសញ្ញានឹងចាប់ផ្តើមលេចចេញឡើង ។
- ស្រូវដែលកើតជំងឺនេះវាបែកគុម្ពច្រើន ។
- ដើមដុះត្រង់ទៅលើ
- ស្លឹកខ្ចី និងមានទំហំស្លឹកតូចមានពណ៌លឿងលាយបៃតង មានស្នាម ឬពណ៌ច្រេះតូចៗ ។
- ស្រូវកើតជំងឺនេះវាសរសៃរហូតដល់ទំ ។



រូបភាព ៤៥ ៖ រោគសញ្ញារបស់ជំងឺត្បាញស្មៅ

## ការបំផ្លាញ

- ស្រូវមិនអាចបង្កើតកូរ ។

## កត្តាដែលបង្កឱ្យជំងឺកើតឡើង

- មានវត្តមានសត្វមមាចភ្លោត ។

## វិធានការការពារ និងកម្ចាត់

- ប្រើប្រាស់ពូជដែលធន់នឹងជំងឺ និងភ្នាក់ងារចម្លងមេរោគ ។
- ប្រើប្រាស់ដីឲ្យមានគុណភាព ដោយចៀសវាងការប្រើដីអាសូត ច្រើនពេក ។
- ដកដើមស្រូវដែលកើតជំងឺរួចបំផ្លាញចោល ។
- ប្រើប្រាស់វិធានការចម្រុះដើម្បីគ្រប់គ្រង និងកម្ចាត់សត្វមមាចភ្លោតដែលជាភ្នាក់ងារចម្លងជំងឺ ។



រូបភាព ៤៦ ៖ រោគសញ្ញាបំផ្លាញរបស់ជំងឺត្បៀស

## ឃ.៧ ជំងឺត្បៀសស្លឹក

### ការពិពណ៌នា

- ជំងឺត្បៀសស្លឹកវាឆ្លងដោយពពួកមមាចភ្លោត ។
- ដើមដែលកើតជំងឺវាមានភាពត្បឿនៅ ដើមដំណាក់កាលលូតលាស់ ។
- ស្លឹកខ្ចី មានពណ៌បៃតងចាស់ ជាយស្លឹករុញ និងតូស្លឹករមូល ។
- នៅលើស្លឹក និងស្រទបស្លឹកដែលកើតជំងឺមានស្នាមពកលើសរសៃស្លឹក ។
- ស្លឹងទង់ជ័យខ្ចី និងរមូល ។
- ស្រូវមិនអាចផ្កា និងកូរស្រូវមិនអាចលេចចេញមកក្រៅបាន ឬបានតែមួយផ្នែក ។



រូបភាព ៤៧ ៖ ជំងឺត្បៀសស្លឹក



## ការបំផ្លាញ

- ស្រូវមិនអាចចេញកូរបានទាំងអស់ ។

## កត្តាដែលបង្កឱ្យដំណើរការកើតឡើង

- វត្តមានសត្វមាចត្នោត និងដំណាំជម្រករបស់ជំងឺ ។

## វិធានការការពារ និងកម្ចាត់

- ប្រើប្រាស់ពូជដែលធន់នឹងជំងឺ និងភ្នាក់ងារចម្លងមេរោគ ។
- ប្រើប្រាស់ដីឲ្យមានគុណភាព ដោយចៀសវាងរបៀបដីអាសូតច្រើនពេក ។
- ដកដើមស្រូវដែលកើតជំងឺរួចបំផ្លាញចោល ។
- ប្រើប្រាស់វិធានការចម្រុះដើម្បីគ្រប់គ្រង និងកម្ចាត់សត្វមាចត្នោតដែលជាភ្នាក់ងារចម្លងជំងឺ ។



រូបភាព ៤៨ ៖ រោគសញ្ញាបំផ្លាញរបស់ជំងឺតៀរព្រូស្លឹក

## ឃ.៨ ជំងឺរលួយស្រទបស្លឹក

### ការពិពណ៌នា

- ជំងឺនេះបង្កដោយមេរោគផ្សិត សារូក្លាដូមអូរីហ្សែ (Sarocladium oryzae) ។
- ស្រទបស្លឹកដែលកើតជំងឺនេះមានស្នាមដំបៅពណ៌ប្រផេះនៅផ្នែកកណ្តាល និងពណ៌ក្រហមក្រមៅនៅជាន់ស្លឹក ។
- ស្រទបស្លឹកប្រពណ៌ ហើយស្នាមដំបៅរីកចូលគ្នាពេញផ្ទៃស្រទបស្លឹក ។
- ករណីធ្ងន់ធ្ងរស្រូវមិនអាចលេចចេញពីស្រទបស្លឹកបាន ។
- កូរស្រូវមិនអាចលេចចេញមកក្រៅ និងរលួយ



រូបភាព ៤៩ ៖ ជំងឺរលាកស្រទបស្លឹក

ហើយផ្កាស្រូវប្រែទៅជាពណ៌ក្រហមឆ្នោត ឬឆ្នោតចាស់ ។

- ដើមស្រូវកើតជំងឺគេឃើញមានម្សៅពណ៌សកើតមាននៅលើស្រទមស្លឹកខាងក្នុង ។ គួរស្រូវគ្មានគ្រាប់ ស្វិត ឬគ្រាប់មិនពេញ ។

### ការបំផ្លាញ

- បង្កើតស្នាមបំផ្លាញលើស្រទមស្លឹក ។
- គួរស្រូវមិនមានគ្រាប់ ឬមានគ្រាប់មិនពេញលេញ ។



រូបភាព ៥០ ៖ រោគសញ្ញាបំផ្លាញរបស់ជំងឺរលាកស្រទមស្លឹក

### កត្តាដែលបង្កឱ្យជំងឺកើតឡើង

- ស្រូវមានស្នាមរបួសដែលបង្កឡើងដោយការបំផ្លាញរបស់សត្វល្អិត ។
- ប្រើដីអាសូតច្រើនពេក ។
- មានសំណើមខ្ពស់ ។
- សីតុណ្ហភាពពី ២០ ទៅ ២៨ អង្សាសេ ។

### វិធានការការពារ និងកម្ចាត់


- កុំស្ទងញឹកពេក ។
- ប្រើប្រាស់ជីប៉ូតាស្យូមនៅដំណាក់កាលបែកគុម្ពដើម្បីធ្វើឲ្យជាលិកាដើម និងស្លឹកស្រូវរឹងមាំ ។
- ប្រើប្រាស់កាលស្យូមស៊ុលផាត និងសង្កសីដោយបាញ់លើស្រូវក្នុងដំណាក់កាលបែកគុម្ព ។
- សម្អាតស្រែ ដុតគល់ជញ្ជាំងស្រូវដែលកើតជំងឺ និងកម្ចាត់ស្មៅចង្រៃចោល ។
- ប្រើថ្នាំពុលកសិកម្មដោយធ្វើការពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញ។ ថ្នាំដែលអាចប្រើបានមាន៖ បេណូមីល (Benomyl) កាបិនដាហ្ស៊ីម (Carbendazim) ខូបពើអុកស៊ីក្លរីដ (Copper oxychloride) អ៊ីចហ្សាកូណាហ្សូល (Hexaconazole) ម៉ង់កូហ្សែប (Mancozeb) ប្រូក្លរ៉ាស (Prochloraz)

ប្រូពីកូណាហ្សូល (Propiconazole) ប្រូពីណែប (Propineb) ត្យូហ្វាណាតមេទីល (Thiophanate methyl)

## ឃ.៩ ជំងឺខ្វះសារធាតុអាសូត

### រោគសញ្ញា

- ស្លឹកប្រៃពណ៌លឿង ឬបៃតងប្រលែត ។
- កម្ពស់ដើមទាប ។
- បែកគុម្ពតិច ។
- ស្លឹកតូច ហើយស្លើខាងក្រោមងាប់ ។
- ដើមត្រង់ ។



រូបភាព ៥១ ៖ ជំងឺខ្វះសារធាតុអាសូត

### វិធានការការពារ

- ប្រើដីធម្មជាតិទ្រាប់បាតឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ ។
- គ្រប់គ្រងទឹក និងរក្សាសំណើមដីឲ្យសើមជានិច្ច ។
- ប្រើប្រាស់ដី អ៊ុយរ៉េប៉ង់ប៉ង់ពេលបែកគុម្ព និងកើតកូរ ។




រូបភាព ៥២ ៖ ការបាចដី

## ឃ.១០ ជំងឺខ្វះសារធាតុផូស្វ័រ

### រោគសញ្ញា

- ដើមក្រិន និងឈត្រង់ ។
- ស្លឹកតិចមានពណ៌បៃតងចាស់ និងស្លឹកខាងក្រោមមានពណ៌លឿងទុំឬក្រហមស្វាយ ។
- បែកគុម្ពតិច ។

### វិធានការការពារ



រូបភាព ៥៣ ៖ ជំងឺខ្វះសារធាតុផូស្វ័រ



- ប្រើដីធម្មជាតិទ្រាប់បាតឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ ។
- គ្រប់គ្រងទឹក និងរក្សាសំណើមដីឲ្យសើមជានិច្ច ។
- ប្រើប្រាស់ដី ដេអាប៊ីទ្រាប់បាត និងបំប៉នក្រោយពេលស្ងួតបាន ១៥ថ្ងៃ ។



រូបភាព ៥៤ ៖ ការបាចដី

### ឃ.១១ ជំងឺពុលជាតិដែក

#### រោគសញ្ញា

- ស្លឹកប្រៃពណ៌ទៅជាលឿងទុំ ក្រហមស្វាយ ឬពណ៌ត្នោត ។
- បែកគុម្ពតិច ។



រូបភាព ៥៥ ៖ ជំងឺពុលដែក

### វិធានការការពារ

- ប្រើពូជដែលធននឹងជាតិដែក ។
- ពន្យារពេលនៃការដាំដុះរហូតដល់ផុតកំហាប់ដែក (ក្រោយពីបញ្ចូលទឹកបាន ១០ ទៅ ២០ថ្ងៃ) ។
- បញ្ចេញបញ្ចូលទឹកស្រែឲ្យបានញឹកញាប់ ។
- ប្រើប្រាស់ដីឲ្យមានគុណភាព ជាពិសេស N P K និង បន្ថែមដី Mg ។
- ចៀសវាងប្រើលាមកសត្វ និងសារធាតុពុកផុយច្រើនពេក ។
- បញ្ចេញទឹកចោលពីក្នុងស្រែ និងទុកក្នុងរយៈពេលពី ៧ ទៅ ១០ថ្ងៃក្នុងដំណាក់កាលបែកគុម្ព ។
- គួរហាលដីបន្ទាប់ពីប្រូតរួច ដើម្បីកាត់បន្ថយការផលិតជាតមេតានក្នុងដី ។

### ឃ.១២ ដំណាំពុលជាតិប្រៃ

#### រោគសញ្ញា

- ស្លឹកស្រូវប្រៃជាពណ៌ស ។
- ស្រូវក្រិន មិនសូវបែកគុម្ព ។

### វិធានការការពារ

- ប្រើពូជដែលធននឹងជាតិប្រៃ ។
- បញ្ចូលទឹកស្រែទុករយៈពេលពី ២ ទៅ ៤ សប្តាហ៍មិននឹងដាំដុះ ។
- ប្រើប្រាស់ដី N P K ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ ជាពិសេសដី K ។
- ប្រើប្រាស់ដីធម្មជាតិដើម្បីបង្កើន pH ដី និង បង្កើនសារធាតុប៉ូតាស្យូមក្នុងដី ។
- បញ្ចេញទឹកពីក្នុងស្រែក្នុងករណីឃើញមាន រោគសញ្ញាពុលជាតិប្រៃ រួចបញ្ចូលទឹកថ្មីសាបរំលង ។



រូបភាព ៥៦ ៖ ដំណាំពុលប្រៃ

### ខ. ការកាត់ពូជលាយ

ការកាត់ពូជលាយចេញ គឺជាដំណើរការនៃការកាត់ចេញនូវដើមស្រូវណា ដែលគេមើលឃើញថា មានលក្ខណៈប្លែកពីគេ (Phenotype) តាមរយៈភ្នែកទទេ។ ស្មៅចង្រៃ និងដំណាំផ្សេងៗទៀតក៏អាច កាត់ចេញនៅពេលកាត់ពូជលាយផងដែរ។ លក្ខណៈខុសគ្នាដែលគេអាចកំណត់ថាជាពូជលាយមានដូចជា

កម្ពស់ដើម ពណ៌របស់ដើម ទំហំស្លឹក លក្ខណៈរូបរាងនៃគ្រាប់ ទម្រង់ស្លឹកទង់ជ័យ ពេលវេលាចេញផ្កា ប្រវែងកូរ និងការតំរៀបគ្រាប់ក្នុងកូរ។ ការកាត់ពូជលាយ មានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងផលិតកម្ម គ្រាប់ពូជ ព្រោះវាជាយន្តការមួយដែលអាចកាត់បន្ថយភាពមិនសុទ្ធរបស់គ្រាប់ពូជបានមួយកំរិតធំ។ ការ កាត់ពូជលាយគួរធ្វើឡើង ចំនួន ៣លើក លើកទី ១ នៅដំណាក់កាលបែកគុម្ព លើកទី ២ ចេញកូរចេញផ្កា និងលើកទី ៣ ដំណាក់កាលទុំ។

### ការកាត់លើកទី ១

ការកាត់ពូជលាយលើកទី ១ គឺត្រូវធ្វើឡើងចាប់ពីដំណាក់កាលបែកគុម្ព រហូតដល់ដំណាក់កាល ពន្លតដើម ។ ការកាត់ពូជលាយក្នុងដំណាក់កាលនេះគេពិនិត្យមើលទៅលើ៖

- លក្ខណៈបែកគុម្ព
- ពណ៌របស់ដើម និងស្លឹក
- កំពស់របស់ដើមស្រូវ

**ចំណាំ៖** ការដកចេញនូវដើមស្រូវ ឬស្មៅដែលសង្ស័យត្រូវដកទាំងឫស មិនត្រូវទុកឫសវាឡើយ ។

### ការកាត់លើកទី ២

ការកាត់ពូជលាយលើកទី ២ គឺត្រូវធ្វើចាប់ពីដំណាក់កាលចេញផ្កាដំបូងរហូតដល់ដំណាក់កាល ដាក់ទឹកដោះ ។ ក្នុងដំណាក់កាលនេះកសិករត្រូវពិនិត្យមើលលើ៖

- ការចេញផ្កាមុន ឬក្រោយរបស់ស្រូវ
- កំពស់ដើម៖ ទាប ឬខ្ពស់ជាងគេ
- ពណ៌ដើម
- ពណ៌ស្លឹក
- ទំហំស្លឹក
- ប្រវែងស្លឹក
- លក្ខណៈរបស់ស្លឹកទង់ជ័យ
- លក្ខណៈរបស់កូរ
- ពណ៌របស់គ្រាប់ស្រូវ
- ប្រវែងរបស់គ្រាប់៖ វែង ឬខ្លីជាងធម្មតា
- ពណ៌ចុងគ្រាប់
- គ្រាប់មានកន្ទុយ ឬគ្មានកន្ទុយ



រូបភាព ៥៧ ៖ ស្រូវក្នុងដំណាក់កាលចេញផ្កា

**ចំណាំ៖** បើពិនិត្យឃើញមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចការរៀបរាប់ខាងលើត្រូវដកចេញនូវដើមស្រូវ ដែលសង្ស័យ ត្រូវដកទាំងឫស មិនត្រូវទុកឫសវាឡើយ ។



### ការកាត់លើកទី ៣

ការកាត់ពូជលាយលើទី ៣ គឺគេត្រូវធ្វើឡើងនៅរយៈពេល ២សប្តាហ៍/ ១៥ថ្ងៃមុនពេលច្រូត ។ ក្នុងដំណាក់កាលនេះគេពិនិត្យទៅលើ ៖

- លក្ខណៈរបស់កូរ
- លក្ខណៈរបស់គ្រាប់ ៖ តូច ឬធំ
- ប្រវែងកូរ ៖ វែង ឬខ្លី

លក្ខណៈផ្សេងៗទៀតដូចដំណាក់ កាលទី ១ និងទី ២ ដែរ



រូបភាព ៥៨ ៖ ស្រូវក្នុងដំណាក់កាលទុំ

## ៤. ការប្រមូលប្រមូលផល

កសិករអាចចាប់ផ្តើមប្រមូលផលបាននៅពេលពិនិត្យឃើញស្រូវនៅក្នុងស្រែប្រែទៅជាពណ៌លឿងដូចពណ៌មាស។ នៅក្នុងផលិតកម្មពូជគេគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នកុំដាក់ខ្ពស់ក្នុងការប្រមូលផល។ ដើម្បីឲ្យគ្រាប់ពូជមានជំនុះល្អ គេត្រូវប្រមូលផលនៅពេលស្រូវទុំបានចាប់ពី ៩០ % ឡើងទៅ ។

### ៤.១ ការច្រូតកាត់

ការច្រូតកាត់នៅក្នុងផលិតកម្មពូជគេអាចធ្វើឡើងបានពីរវិធីគឺ ការច្រូតកាត់ដោយដៃ និងការច្រូតកាត់ដោយប្រើម៉ាស៊ីន ។

#### ក. ការច្រូតកាត់ដោយដៃ

ការច្រូតកាត់ដោយដៃគឺជាវិធីដ៏ប្រសើរបំផុតក្នុងផលិតកម្មពូជស្រូវព្រោះថាការច្រូតកាត់ដោយដៃវាមិនបណ្តាលឲ្យគ្រាប់ស្រូវជ្រុះខ្ចាត់ខ្ចាយ និងពុំទទួលរងនូវការកកិត ឬប៉ះទង្គិចដល់គ្រាប់ស្រូវដែលបណ្តាលយឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជំនុះ ។ ម្យ៉ាងវិញទៀតការច្រូតដោយដៃអាចចៀសវាងបាននូវការច្រឡំ ឬលាយឡំពូជស្រូវផ្សេងៗទៀត ។



រូបភាព ៥៩ ៖ ការច្រូតកាត់ដោយដៃ

## ខ. ការច្រូតកាត់ដោយម៉ាស៊ីន

ការច្រូតកាត់ដោយម៉ាស៊ីនមានភាព រហ័សជាងនិងចំណេញពេលវេលាជាងការច្រូត កាត់ដោយដៃ តែការច្រូតកាត់ដោយម៉ាស៊ីនវាប ណ្តាលឲ្យគ្រាប់ស្រូវទទួលរងនូវការប៉ះទង្គិចខ្លាំង និងធ្វើឲ្យគ្រាប់ស្រូវជ្រុះខ្ចាត់ខ្ចាយច្រើន ។ ក្នុង ករណីប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនក្នុងការច្រូតកាត់សម្រាប់ ផលិតកម្មពូជគេបានណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន **កុំបៃ** ដែលច្រូតចេញជាគ្រាប់តែម្តង ។ ចំពោះគ្រាប់ ស្រូវដែលចេញពីម៉ាស៊ីនត្រូវត្រងគ្រាប់ស្រូវចំនួនពី ២ ទៅ ៣បារដំបូង ។



រូបភាព ៦០ ៖ ការច្រូតកាត់ដោយម៉ាស៊ីន

## ៤.២ ការបោកបែន

នៅក្នុងផលិតកម្មផលិតពូជវិធីសាស្ត្រដែលប្រសើរ បំផុតគឺបែនដោយជើង ឬច្រូតដោយដៃ ។ ការធ្វើដូចនេះគឺវា មិនបណ្តាលឲ្យគ្រាប់ស្រូវទទួលរងការប៉ះទង្គិច មិនប្រេះ ឬ បាក់ និងគ្រាប់ស្រូវមានដំណុះល្អ ។ ចំពោះការបោកបែន ដោយដៃវាជាមួយនឹងក្តាបោក ក៏ដូចជាការបោកបែន ដោយប្រើម៉ាស៊ីនវាធ្វើឲ្យគ្រាប់ស្រូវទទួលរងនូវការកកិត និងប៉ះទង្គិចខ្លាំងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណុះ ។ តែបើក្នុងករណីតម្រូវការបោកដោយចៀសមិនផុតត្រូវ អនុវត្តវិធីសាស្ត្របោកដោយដៃ ហើយការបោកត្រូវបោក ដោយថ្មមដៃដើម្បីចៀសវាងការប៉ះទង្គិច ឬធ្វើឲ្យបាក់គ្រាប់ ដែលវាប៉ះពាល់ដល់ដំណុះគ្រាប់ ។



រូបភាព ៦១ ៖ ការបែនស្រូវ



### ៤.៣ ការហាលសំងួត

ដើម្បីកុំឱ្យបាត់បង់គុណភាពគ្រាប់ពូជ កសិករគប្បីហាលសំងួតភ្លាមបន្ទាប់ពីច្រូតរួច ព្រោះវាធ្វើឱ្យសម្បុរគ្រាប់ភ្លឺថ្លា។ គុណភាពគ្រាប់ពូជក៏អាចទាក់ទងផងដែរជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រសំងួត។ មានវិធីសាស្ត្រសំងួតស្រូវ ២ បែប គឺហាលដោយកំដៅថ្ងៃ និងសំងួតដោយឡសំងួត។

- ការហាលដោយពន្លឺថ្ងៃ គឺមានគុណភាពល្អ ប្រសិនបើយើងមានកំលាំងពលកម្មគ្រប់គ្រាន់សំរាប់វែកហាលឱ្យបានជាប្រចាំ។ ការហាលស្រូវពូជដោយពន្លឺថ្ងៃ គឺត្រូវប្រមូលជាពន្លា និងគ្របនៅពេលកំដៅថ្ងៃខ្លាំងពេល (ម៉ោង ១២ ដល់ម៉ោង ១១រសៀល) ហើយអាចពង្រាយហាលឡើងវិញនៅម៉ោង ២ រសៀល ពេលកំដៅថ្ងៃថយចុះ។ តែកសិករគួរប្រុងប្រយ័ត្នការហាលស្រូវពូជច្រើនមុខក្បែរគ្នាព្រោះវាមានឱកាសច្រើនក្នុងការលាយដោយសារសត្វរត់កាត់ ខ្យល់បក់ខ្លាំង (ខ្យល់គូច) ឬការបាចស្រូវពូជបញ្ចូលគ្នាដោយសារកូន ក្មេងលេង។ ដូច្នេះដើម្បីការពារយើងត្រូវគ្របស្បែកលើទីលានហាលស្រូវនីមួយៗ ជាដាច់ខាត។
- ការសំងួតដោយឡសំងួត ជាពិសេស (Flat Bed Dryer) អាចជួបប្រទះនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាពិបាកកំណត់កំដៅក្នុងឡមិនឱ្យក្តៅខ្លាំងពេក និងពិបាកកើបចូល និងកើបចេញពីឡ តែចំពោះឡសំងួតបែបនេះ គឺមានលក្ខណៈបំផុតចំពោះផលិតគ្រាប់ពូជទ្រង់ទ្រាយធំ។ ជាទូទៅសំណើមគ្រាប់ស្រូវដែលល្អសម្រាប់ស្តុក គឺចន្លោះពី ១២-១៤% ។



រូបភាព

### ៤.៤ ការសម្អាតគ្រាប់

សៀវភៅណែនាំបច្ចេកទេសអំពី ផលិតកម្មពូជស្រូវ



រូបភាព ៦៣ ៖ កង្ហានិងឧបករណ៍បក់សម្អាតគ្រាប់ស្រូវ

គ្រាប់ស្រូវដែលហាលស្ងួតហើយត្រូវយកមកបក់សម្អាតសំដី ផ្កាស្មៅ និងកំទេចកំទីសម្រាម ចេញ។ ការសម្អាតគ្រាប់គេអាចធ្វើដោយវិធីសាស្ត្ររោយធម្មតាដោយប្រើកំលាំងខ្យល់ និងការបក់សម្អាត ដោយប្រើកង្ហាប់កំ ឬឧបករណ៍បក់សម្អាត ។

## ៤.៥ ការវេចខ្ចប់ និងការទុកដាក់

### ក. ការវេចខ្ចប់

បន្ទាប់ពីបក់សម្អាតយកសំដី កំទេចកំទីសម្រាម និង ផ្កាស្មៅចេញរួចស្រេចបាច់ហើយ គេអាចច្រកគ្រាប់ពូជចូល ក្នុងបារ រួចដេរភ្លិតមាត់បារដោយម៉ាស៊ីនដេរមាត់បារ រួច យកក្នុងទីកន្លែងសម្រាប់ស្តុកដែលមានសុវត្ថិភាព ។



រូបភាព ៦៤ ៖ ការវេចខ្ចប់ស្រូវពូជត្រឹមត្រូវ

### ខ. ការទុកដាក់

ការទុកដាក់ស្រូវពូជបានល្អ គឺធ្វើឱ្យស្រូវពូជ រក្សាគុណភាពបានយូរ និងដោយសុវត្ថិភាព ។ មុននឹង យកស្រូវពូជទៅទុក កសិករគប្បីគិតគូរអំពីសំណើមគ្រាប់ ភាពគគ័រមត់នៃឃ្លាំង ការវេចខ្ចប់ និងការតំរៀបបារស្រូវ ពូជ។ មួយវិញទៀតគ្រាប់ស្រូវត្រូវមានអត្រាសំណើមទាប ជាង ១៣% - ១៤% ។ ការទុកដាក់ពូជស្រូវបានល្អនឹង ធ្វើឲ្យថយចុះនូវការបំផ្លាញពីសត្វល្អិត កណ្តុរ និងជំងឺ ផ្សិត ។



រូបភាព ៦៥ ៖ ការទុកដាក់ស្រូវពូជត្រឹមត្រូវ

ទីកន្លែងទុកគ្រាប់ពូជស្រូវត្រូវតែជាកន្លែងស្ងួត មានខ្យល់ចេញ ចូលល្អ មានដំបូល និងជញ្ជាំងបិទ ជិត មិនជ្រាបទឹក និងមិនមានកណ្តុរបំផ្លាញ ។ បារគ្រាប់ពូជត្រូវតម្រៀបជាជួរជាជួរដោយមានទ្រាប់ កម្រាលឈើទ្រាប់ខាងក្រោមឲ្យផុតពីដី ឬកម្រាលឥដ្ឋ/ស៊ីម៉ង់ត៍ ។

## ៤.៥ ដំណេកគ្រាប់

**ក. អ្វីទៅជាដំណេកគ្រាប់ ?**

គ្រាប់ពូជនឹងមិនដុះនៅពេលដែលយើងយកទៅសាបស្លាមបន្ទាប់ពីច្រូតកាត់ និងបោកបែនរួច ។ នេះដោយសារគ្រាប់ស្ថិតនៅក្នុងដំណេកនៅឡើយ ។

**ខ. អត្ថប្រយោជន៍នៃការយល់ដឹងពីដំណេកគ្រាប់**

- ការពារដំណុះគ្រាប់នៅក្នុងកូរ ។
- ការពារនូវដំណុះគ្រាប់ដែលច្រូតកាត់នៅសើម ហើយយកមកស្តុកទុកដោយពុំបានហាលសំងួត ។

**គ. វិធីសាស្ត្រដាស់ដំណេកគ្រាប់**

គ្រាប់ពូជដែលមានដំណេកយូរ គេអាចដាស់ដំណេកវាបានដោយប្រើវិធីសាស្ត្រដាស់ដំណេកបែបសិប្បនិម្មិត ក្នុងករណីគេត្រូវការយកគ្រាប់ពូជទៅសាបបន្ទាប់ពីច្រូតកាត់ បោកបែនរួចស្លាម ។ វិធីសាស្ត្រនេះអនុវត្តជាជំហានៗដូចខាងក្រោម៖

- បញ្ចុះសំណើមគ្រាប់ពូជឲ្យមកដល់ត្រឹម ៥% ក្នុងសីតុណ្ហភាពពី ២៥ អង្សាសេ ទៅ ៣០អង្សាសេ។
- សំងួតគ្រាប់ពូជក្នុងកម្រិតសីតុណ្ហភាព ៥០ អង្សាសេ ក្នុងរយៈពេល ៥ថ្ងៃជាប់ៗគ្នា ។
- ក្នុងករណីមិនមានឧបករណ៍ដាស់ដំណេកគ្រាប់ កសិករគប្បីហាលថ្ងៃស្រូវពូជនឹងកំដៅថ្ងៃ ។ តែត្រូវចៀសវាងហាលក្នុងពេលថ្ងៃក្នុងខ្លាំង (ក្នុងចន្លោះម៉ោង ១២ ដល់ ម៉ោង ២ រសៀល) ព្រោះក្នុងវេលាម៉ោងនេះ ថ្ងៃមានកំដៅខ្លាំងដែលវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណុះគ្រាប់ពូជស្រូវ ។

**ចំណាំ៖** បើមិនបញ្ចុះសំណើមមក ៥%ជាមុនទេ នោះវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ និងបំផ្លាញដល់អំប្រើយ៉ូងរបស់គ្រាប់ពូជ ។

**៥. ការវិភាគសេដ្ឋកិច្ច និងការស្តង់ទិន្នផល**

**៥.១ ការវិភាគសេដ្ឋកិច្ច**

ការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចវាជាមធ្យោបាយដ៏ប្រសើរសម្រាប់វិភាគឲ្យដឹងថាតើក្នុងមួយផលិតកម្មយើងចំណាយអស់ប៉ុន្មាន លើអ្វីខ្លះ និងយើងទទួលបានចំណេញ ឬខាតយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ និងដោយសារមូលហេតុអ្វី ។

# តារាងវិភាគសេដ្ឋកិច្ចក្នុង ១ វដ្តផលិតកម្មនៃការផលិតពូជស្រូវ

ឈ្មោះពូជ.....អាយុកាល.....រដូវ.....

ក. តារាងចំណាយ

| រាយមុខចំណាយ                 | ចំនួន/ឯកតា | តម្លៃរាយ | តម្លៃសរុប |
|-----------------------------|------------|----------|-----------|
| <b>ការរៀបចំដី៖</b>          |            |          |           |
| ម្រាប់សាប (ភ្ជួរ និងរាស់)   |            |          |           |
| ម្រាប់ស្ទង់ (ភ្ជួរ និងរាស់) |            |          |           |
| <b>សម្ភារៈ ៖</b>            |            |          |           |
| ពូជ                         |            |          |           |
| ដី                          |            |          |           |
| ថ្នាំពុល                    |            |          |           |
| <b>កំណែទម្រង់កម្ម ៖</b>     |            |          |           |
| សាប                         |            |          |           |
| ដកសំណាប                     |            |          |           |
| ស្ទង់                       |            |          |           |
| ច្រូត                       |            |          |           |
| បោកបែន                      |            |          |           |
| <b>ឈ្នួលឧបករណ៍ ៖</b>        |            |          |           |
| បូមទឹក                      |            |          |           |
| ដឹកជញ្ជូន                   |            |          |           |
| ឧបករណ៍ផ្សេងៗ                |            |          |           |
| <b>សរុប</b>                 |            |          |           |



ខ. តារាងចំណូល

| រាយមុខចំណូល | ចំនួន/ឯកតា | តម្លៃរាយ | តម្លៃសរុប |
|-------------|------------|----------|-----------|
|             |            |          |           |
|             |            |          |           |
|             |            |          |           |
|             |            |          |           |
|             |            |          |           |
|             |            |          |           |
|             |            |          |           |
|             |            |          |           |
|             |            |          |           |
|             |            |          |           |
| សរុប        |            |          |           |

គ. ការវិភាគចំណេញខាត

| បរិយាយ                           | ចំនួនទឹកប្រាក់ |
|----------------------------------|----------------|
| ចំណាយសរុប (ក) (ចម្លងពីតារាងទី ១) |                |
| ចំណូលសរុប (ខ) (រៀល)              |                |
| ចំណេញសរុប (រៀល) (ខ – ក)          |                |

## ៥.២ ការស្ទង់ទិន្នផលស្រូវ

៥-រូបមន្តសម្រាប់គណនាកម្រិតទិន្នផល

$$\text{ទិន្នផលល (ហិកតា)} = \frac{90,000 \times \text{ទិន្នផលដែលទទួលបាន (ម<sup>២</sup>)}}{\text{ទំហំសំណាក (ម<sup>២</sup>)}}$$

$$\text{ទម្ងន់នៅកំរិតសំណើមម ១៥ \%} = \frac{\text{ទម្ងន់ ១ ហ.ត X (១០០-សំណើមពេលឆ្អឹងទម្ងន់)}}{\text{៨៦}^{(1)}}$$

---

(<sup>1</sup>) ៨៦ នេះគឺបានមកពី ១០០-១៤% នៃសំណើមរបស់ស្រូវ

## រូបមន្តងាយសម្រាប់បង្រៀនកសិករ

$$\text{ទិន្នផលទម្ងន់ស្រូវស្ងួត} = \text{ទម្ងន់ស្រូវសើមក្នុង ១ ម<sup>២</sup> X ០,៩១}$$

វិធីសាស្ត្រក្នុងការគណនាទិន្នផលស្រូវ ៖

ដើម្បីចង់ដឹងអំពីទិន្នផលស្រូវ ដែលយើងទទួលបាន នៅលើផ្ទៃដីផលិតកម្ម ត្រូវអនុវត្តដូចតទៅ ៖

- ជ្រើសរើសសំណាកនៅលើស្រែ ១ -៥ កន្លែង។ ក្នុង ១ កន្លែង ១ម X ១ម = ១ម<sup>២</sup>      ឬ  
២ម X ២ម = ៤ម<sup>២</sup> (ទៅតាមទំហំស្រែ)
- ប្រមូលផលទិន្នផលស្រូវនៅទីតាំងដែលបានជ្រើសរើស
- ធ្វើការបោកបែនទិន្នផលដែលទទួលបាន រួចថ្លឹងទម្ងន់

តាមរូបមន្ត ៖

បរិមាណដែលថ្លឹងរួច ធៀបនឹងទំហំដែលបានជ្រើសរើសគិតជា ( ម<sup>២</sup>)

ឧទាហរណ៍ ៖      ទិន្នផលទទួលបាន / ៤ម<sup>២</sup> = ១,៥ គ.ក្រ

$$១០,០០០ \text{ ម}^2 = ១ \text{ ហិកតា}$$

ដូច្នេះយើងបាន

$$\text{ទិន្នផល/ ហិកតា} = \frac{១០,០០០ \text{ X } ១,៥ \text{ គ.ក្រ}}{៤ \text{ ម}^2} = ៣,៧៥០ \text{ គ.ក្រ}$$

$$\text{ដូច្នេះ យើងបាន ១៤ \%} = \frac{៣,៧៥០ \text{ គ.ក្រ X (១០០-២០)}}{៨៦} = \underline{\underline{៣,៤៨៨,៣៧ \text{ គ.ក្រ}}}$$

## ឯកសារយោង

- អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម: ២០១៣ ៖ សៀវភៅបង្កប់ច្រើនទេសប្រពលវប្បកម្មដំណាំស្រូវ ។
- គម្រោងពង្រឹងសមត្ថភាពសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យបរិមាណគុណភាពកសិកម្ម: ២០១១ ៖ សៀវភៅណែនាំអំពីការគ្រប់គ្រងសមាសភាពចង្រៃ ។
- គម្រោងបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្កើនផលិតភាពជុំវិញតំបន់ទន្លេសាប: ២០១៣ ៖ សៀវភៅណែនាំបច្ចេកទេសស្តីពីផលិតកម្មពូជស្រូវ ។
- គម្រោងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មខ្នាតតូចតំបន់ទន្លេសាប(TSPRSDP): (មិនមានកាលបរិច្ឆេទ)៖ គោលការណ៍ណែនាំបច្ចេកទេសស្តីពីផលិតកម្មពូជស្រូវ ។
- កម្មវិធីបង្កើនគុណភាពផលិតផលកសិកម្ម (AQIP) (មិនមានកាលបរិច្ឆេទ)៖ ផលិតកម្មគ្រាប់ពូជសុទ្ធ ។
- ឡាយ ឡេងហូត (មិនមានកាលបរិច្ឆេទ) ៖ បទបង្ហាញស្តីពីផលិតកម្មពូជស្រូវ ។
- អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម ៖ ដំណាំស្រូវ
- [www.knowledgebank.irri.org](http://www.knowledgebank.irri.org)
- <http://ricehoppers.net/2009/03/spraying-for-leaf-folders-increases-crop-vulnerability-to-planthopper-outbreaks/>
- [http://pinoylancers.com/farmchem/index.php?option=com\\_content&view=article&id=91&Itemid=77](http://pinoylancers.com/farmchem/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=77)
- <http://agropedia.iitk.ac.in/content/rice-case-worm> និង <http://www.rkmp.co.in/content/rice-case-worm-surtilitil-ali>
- <http://www.pestalert.org/espanol/PhotoDetail.cfm?RecordID=78>
- <http://extension.missouri.edu/p/MP645>
- [http://www.knowledgebank.irri.org/sriLanka/Research/pyra\\_resi.html](http://www.knowledgebank.irri.org/sriLanka/Research/pyra_resi.html) និង <http://www.knowledgebank.irri.org/RiceDoctor/information-sheets-mainmenu-2730/diseases-mainmenu-2735.html>
- <http://www.knowledgebank.irri.org/ipm/bacterial-diseases/bacterial-leaf-streak-xanthomonas-oryzae-pv-oryzicola-fang-et-al-swing-et-al.html> និង <http://www.knowledgebank.irri.org/RiceDoctor/information-sheets-mainmenu-2730/diseases-mainmenu-2735/bacterial-leaf-streak-mainmenu-2759.html>
- <http://ricehoppers.net/2010/03/brown-planthoppers-and-virus-diseases-threatening-rice-in-west-java-province-indonesia/>
- <http://www.knowledgebank.irri.org/rkb/pest-management-fact-sheets/diseases/rice-grassy-stunt.html>

- <http://agropedia.iitk.ac.in/content/rice-tungro>
- <http://www.sciencedaily.com/releases/2009/02/090210182437.htm>
- [http://kkn-rsc.ricethailand.go.th/rice/pest/disease/Ragged\\_Stunt.html](http://kkn-rsc.ricethailand.go.th/rice/pest/disease/Ragged_Stunt.html)
- <http://bvtvphutho.vn/Home/Tim-hieu-sau-benh/trencaylua/2009/194/TRIEU-CHUNG-CUA-BENH-VANG-LUN-LUN-XOAN-LA.aspx>
- <http://lariceman.wordpress.com/tag/sheath-blight/>
- <http://extension.missouri.edu/p/MP646>
- <http://www.rkmp.co.in/category/eistags/eis/package-of-practices/crop-protection-with-vernacular-names/diseases/sheath-blig>
- <http://www.knowledgebank.irri.org/smta/importance-of-seed-health-in-seedgermplasm-exchange-mainmenu-84/276.html>
- <http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5390549>
- <http://agropedia.iitk.ac.in/content/sheath-rot>
- [http://psstaging3.pssftware.com/portals/0/images/Rice/Crown\\_sheath\\_rot.jpg](http://psstaging3.pssftware.com/portals/0/images/Rice/Crown_sheath_rot.jpg)
- <http://lazy-lizard-taleis.blogspot.com/2011/07/harry-potter-and-parliament-of-owls.html>
- <http://khmernz.blogspot.com/2009/06/cambodian-farmers-plant-rice-as-their.html>
- <http://www.jica.go.jp/project/english/philippines/0600881/02/index.html>
- <http://agropedia.iitk.ac.in/content/nursery-raising-techniques-organic-basmati-rice>
- <http://aid.dfat.gov.au/countries/eastasia/cambodia/Pages/home.aspx>
- <http://www.cedac.org.kh/?page=detail&ctype=article&id=371&lg=en>
- <http://agriharyana.nic.in/variouscrops.htm>
- <http://www.rkmp.co.in/category/eistags/eis/production-know-how/nursery-management>
- <http://strasa.irri.org/stresses/iron-toxicity>
- [http://www.knowledgebank.irri.org/ricebreedingcourse/Breeding\\_for\\_salt\\_tolerance.htm](http://www.knowledgebank.irri.org/ricebreedingcourse/Breeding_for_salt_tolerance.htm)



# បញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធ

## **សន្មាទុក្រម**

- ការកាត់ពូជលាយ** ៖ គឺជាដំណើរការកាត់ប្រភេទស្រូវ ឬស្មៅដែលខុសពីពូជស្រូវដែលកំពុងដាំដុះ ដើម្បីឲ្យពូជដែលកំពុងដាំដុះនោះមានលក្ខណៈសុទ្ធល្អ ។ ការកាត់ពូជលាយនេះ គេធ្វើឡើងក្នុងបីដំណាក់កាលគឺ ដំណាក់កាលស្រូវបែកគុម្ព ដំណាក់កាលចេញផ្កា និងដំណាក់កាលទុំ ។
- ការធ្វើដំណុះសាក** ៖ គឺជាដំណើរការពិនិត្យទៅលើដំណុះគ្រាប់ពូជដើម្បីកំណត់អំពីបរិមាណពូជយក ទៅសាបឲ្យបានសមស្រប ។
- ជំងឺឆ្លាស់** ៖ គឺជាជំងឺដែលបង្កឡើងដោយមេរោគផ្សិត ហើយច្រើនតែកើតមានលើស្រែដែល លើសជាតិអាសូត ។ ជំងឺនេះវាបង្កឲ្យបាត់បង់ទិន្នផលធ្ងន់ធ្ងរ ។
- ជំងឺទុចក្រោ** ៖ គឺជាជំងឺដែលបង្កឡើងដោយវីរុស ហើយកើតមានលើដំណាំស្រូវ ។ ការបំផ្លាញរបស់ជំងឺនេះមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរ ។
- ដំណេកគ្រាប់** ៖ គឺសំដៅទៅដំណាក់កាលដែលមិនអាចដុះបានរបស់គ្រាប់ពូជក្នុង រយៈពេលជាក់លាក់មួយក្រោមក្រិតក្រមបរិស្ថានធម្មជាតិដូចជា៖ សីតុណ្ហភាព សំណើម ...។ល។
- តុល្យភាព** ៖ នៅក្នុងផលិតកម្មដំណាំស្រូវគេសំដៅទៅការប្រើប្រាស់ដី ឬថ្នាំសមស្របទៅ នឹងតម្រូវការរបស់ដំណាំ គឺថាមិនត្រូវប្រើលើស ឬក៏ខ្វះឡើយ ។
- ថ្នាលដាក់ម៉ុក** ៖ គឺជាប្រភេទថ្នាលសំណាបដែលសាបនៅលើល្បាយដីមានដីជាតិដាក់លើស្រែ ទាប់ប្លាស្ទិក ឬស្លឹកចេក មានផ្ទៃដីរាបស្មើល្អ និងមានការគ្រប់គ្រងទឹកត្រឹមត្រូវ ។
- ទ្រើម** ៖ គឺជាសត្វល្អិតពណ៌ខ្មៅដែលបំផ្លាញដំណាំស្រូវក្នុងវគ្គលូតលាស់ ជាពិសេស បំផ្លាញលើសំណាប ។
- រុក្ខរស** ៖ រសជាតិ ឬសារធាតុចិញ្ចឹមរបស់រុក្ខជាតិ ឬដំណាំ ។

**សត្វមានប្រយោជន៍** ៖ នៅក្នុងផលិតកម្មដំណាំស្រូវសត្វមានប្រយោជន៍គេសំដៅទៅពពួកសត្វជាប្រភេទមានដូចជា៖ ពីងពាង ពីងពាង កង្កែប ស្រីងគោក ខ្លូតដី រុយចោរ កណ្តាប អង្កែតនៃវែង កន្ទុំរុយ អណ្តើកមាស ត្រី ស្រីងទឹក ខ្លូយទឹក និងសត្វវាស់ទឹកជាដើម ។

**អនាម័យស្រែ** ៖ សំដៅទៅការសម្អាតស្រែដូចជា៖ សម្អាតស្មៅតាមភ្លឺស្រែ កម្ទេចជម្រកសត្វចង្រៃក្នុងស្រែ ។ល។ ...

**អតិរេក** ៖ ច្រើនលើសកំណត់ ច្រើនហួសពីចំនួនដែលត្រូវការ ។

## អាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនងរបស់ក្រុមហ៊ុន ឬស្ថាប័នលក់គ្រាប់ពូជ