


ដំណាំអំពៅ



ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ
នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម
គម្រោងឥណទានកម្មវិធី បណ្តាញ អភិវឌ្ឍន៍ អាស៊ី
(ADB) លេខ 1445 - CAM (SF)
ឆ្នាំ ២០០៥

khmerekbookfreedownload.blogspot.com

ដំណាំអំពៅ



១. ស្ថានភាពទូទៅ


អំពៅជាដំណាំមួយប្រភេទ ដែលប្រជាកសិករយើងស្គាល់ស្ទើរ គ្រប់គ្នាទាំងអស់ ហើយដំណាំនេះក៏បានដាំដុះលើផ្ទៃដីតូចៗ ស្ទើរពាសពេញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងដែរ ។

ជាទូទៅប្រជាកសិករតែងនិយមយកអំពៅមកគាបយកទឹកសំរាប់ហូបដូចជាភេសជ្ជៈធម្មតាឬគេនិយមហូបផ្ទាល់តែម្តង ។ សារៈសំខាន់នៃដំណាំនេះក្នុងប្រទេសយើង ក៏ដូចជាក្នុងភិរាពលោក គេបានកែច្នៃទឹកអំពៅយកទៅធ្វើជាស្ករសដែលយើង

ត្រូវការចាំបាច់ខានមិនបានជារៀងរាល់ថ្ងៃ ។ ក្រៅពីសារៈសំខាន់សម្រាប់ធ្វើស្តុកអំពៅ
នៅប្រទេសមួយចំនួនគេបានកែច្នៃទឹកអំពៅយកទៅធ្វើជាអាកុល ស្រា និងធ្វើជាចំណី
សត្វហើយម្យ៉ាងទៀតកាកអំពៅគេបានយកទៅកែច្នៃធ្វើជាក្រដាស ក្តារបន្ទះ ។ល។
ចំពោះប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ដំណាំអំពៅគឺគេបានកែច្នៃធ្វើស្តុកក្នុង
សិប្បកម្មតូចៗប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនេះគឺប្រជាកសិករ យើងនិយមហូបទឹកអំពៅដូចជា
ភេសជ្ជៈធម្មតាប៉ុណ្ណោះ ។

II. តំបន់ដាំដុះ

ជាទូទៅកសិករយើងតែងតែនិយមដាំដុះអំពៅនៅតំបន់តាមដងទន្លេ ដូចជានៅ
ខេត្ត ក្រចេះ កំពង់ចាម កណ្តាល ព្រៃវែង ក្រៅពីតំបន់តាមដងទន្លេ គេអាចដាំដំណាំ
នេះនៅតាមតំបន់ដីខ្ពង់រាប ដីកោះ និងតាមជម្រាលជើងភ្នំ លើដីក្រហម ឬ ដីខ្មៅ



ដូចជានៅតាម ខេត្តបាត់ដំបង
ស្ទឹងត្រែង មណ្ឌលគិរី រតនគិរី
ជាដើម ។ល។

III. បរិស្ថាននៃដំណាំអំពៅ

អំពៅជាដំណាំមួយប្រភេទ
ដែលទាមទារកំដៅខ្លាំងសំរាប់ការ
លូតលាស់ដងដើមក្នុងរយៈពេល
លូតលាស់ដងដើម ស្លឹក ដំណាំ

នេះទាមទារសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ជា មធ្យម ២៥ C ទៅ ៣០ C ក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោងលើកលែងតែដល់ដំណាក់កាលកើតស្ករគឺ ២ ទៅ ៣ខែ មុនពេលកាប់ ទើប ទាមទារសីតុណ្ហភាពទាបជាមធ្យម ១៨ ទៅ ២២ អង្សាសេ ដើម្បី អាចបង្កើតជាតិ ស្ករច្រើន ។

ដំណាំនេះក៏ជាដំណាំមួយដែលត្រូវការទឹកច្រើនបង្កូរដែរ ដូច្នេះដើម្បីធានាឱ្យបាន ផលល្អគឺយើងត្រូវលេប្រាំងណាពេលដែលដំណាំស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលលូតលាស់ខ្លាំង អាចចំពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន ហើយផ្ទុយទៅវិញ ប្រមាណជា ២ ទៅ ៣



ខែមុនពេលប្រមូលផលអាចចំពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់តិច ឬស្ទើរតែគ្មានភ្លៀងធ្លាក់ ទើបជាការប្រសើរក្នុងការផ្តល់ទិន្នផលស្ពាន់ ។

ប្រភេទដីដែលល្អសម្រាប់ដំណាំអំពៅគឺដីល្បាប់ល្បាយខ្សាច់ មិនជាទឹក ដីច្រោះ ទឹកល្អ ដីដែលមានជីជាតិល្អ ដែលមានស្រទាប់ទី ១ ជ្រៅ និងជាដីដែលមាន pH 5,5 ទៅ 6,8 ។ ចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើង ដីដែលសមស្របសម្រាប់ដំណាំនេះ គឺដីល្បាប់ ល្បាយខ្សាច់តាមដងទន្លេ ដីក្រហម និងដីខ្មៅតាមតំបន់ខ្ពង់រាប ។ ដំណាំនេះដាំបាន ល្អនៅលើដីស្រទាប់ទី ១ រាក់ (ជម្រៅស្រទាប់ទី ១ រាក់ជាង ២០ ស.ម) ចំពោះដីដែលមានក្រួសក្រហមច្រើននោះមិនសមស្របសម្រាប់ ដំណាំនេះឡើយ ។

IV. បច្ចេកទេសដាំដុះ និងថែរក្សា :



ក. របៀបវារៈការងារ:

- ព័ត៌មានទូទៅ

ជាទូទៅគេអាចចាប់ផ្តើមដាំក្នុងអំឡុងពេលខែវិច្ឆិកា ធ្នូ រហូតដល់ចុងខែមករា ហើយប្រមូលផលនៅអំឡុងខែសីហា កញ្ញា មុនពេលទឹកឡើងលិចចំការ ។ ការប្រមូលផលនៅក្នុងអំឡុងខែនេះគឺជាទូទៅគេយកអំពៅសម្រាប់តាបយកទឹកហូប ។ ចំពោះការដាំដុះសម្រាប់ធ្វើស្ករ ត្រូវប្រមូលផលក្នុងអំឡុងខែវិច្ឆិកា ធ្នូ ឬមករា គឺចំពេលដែលមានសីតុណ្ហភាពទាប ។ ដូច្នេះដំណាំអាចមានអាយុដល់ទៅ ១១ ខែ ឬ ១២ ខែ និងអាចដល់ ១៣ ខែ ។



- តំបន់ទួលរាប

ចំពោះតំបន់នេះគេអាចចាប់ផ្តើមដាំក្នុងអំឡុងខែ មេសា ពេលដែល មានភ្លៀង ធ្លាក់ដំបូងហើយគេអាចប្រមូលផលក្នុងអំឡុងខែមករា និងកុម្ភៈ ។ ដូច្នេះការប្រមូល ផលក្នុងខែនេះដំណាំអាចមានអាយុប្រមាណជា ១០ ខែ ។

ខ. ការរៀបចំដី

ការភ្ជួររាស់ជាទូទៅចំពោះដំណាំអំពៅក៏ប្រហាក់ប្រហែល និងដំណាំចំការ ផ្សេងៗទៀតដែរ ។ ការភ្ជួររាស់ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីជ្រុយដីឱ្យផុសល្អ ដែលអាចបង្កឱ្យដំណាំដុះលូតលាស់ឆាប់ ម្យ៉ាងទៀតតាមរយៈការរៀបចំដី យើងអាចសម្លាប់ស្មៅសត្វល្អិត និងជម្ងឺមួយចំនួន ។ ជាធម្មតាគេអាចភ្ជួរ ២ សារ និង រាស់ជ្រុយដី ២ ទៅ ៣ សារ ដើម្បីឱ្យដីផុសល្អ ។ លក្ខណៈពិសេស នៃការភ្ជួររាស់គឺការ



ភ្នំលើកទី១ គេធ្វើនៅពេលដែលទឹកស្រកចុះផុតពីចំការ (ចំពោះតំបន់មាត់ទន្លេ)
បន្ទាប់មកគេទុកដីហាលចោលរយៈពេលប្រមាណ ១០ ថ្ងៃ ហើយចាប់ផ្តើមភ្នំលើកទី
២ បន្ទាប់ពីការភ្នំលើកទី ២ ត្រូវរាស់ដីឱ្យបានម៉ត់ល្អ ។ ចំពោះតំបន់ខ្ពង់រាបវិញ គេ
បានចាប់ផ្តើមភ្នំលើកទី ១ ប្រមាណជា ១ ទៅ ២ ខែ មុនពេលដាំ ។ បន្ទាប់មកពេល
ដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ល្មម ហើយគេអាចភ្នំលើកទី ២ រួចរាស់ឆ្នុតរង ឬ កាប់រណ្តៅ
និងចាប់ផ្តើមការដាំដុះតែម្តង ។

គ. របៀបចាំ

ការដាំអំពៅគេអាចធ្វើបានច្រើនយ៉ាងគឺ គេអាចបណ្តុះកូនជាមុនសិន ឬ ក៏
ដាក់ដាំកំណាត់ដើមដែលមានភ្នែកតែម្តង ។



- **ការបណ្តុះបណ្តាល**

- វិធីនេះគឺគេបណ្តុះកូនជាមុនសិន ហើយត្រូវបានគេយកទៅដាំនៅចំការពេលដែលកូននោះលាស់បានធំល្មម (អាយុប្រមាណជា ១ ខែ) វិធីនេះគេច្រើនអនុវត្តចំពោះការដាំក្នុងរណ្តៅ ។

- ជាដំបូងគេត្រូវកាត់ជាកំណាត់ខ្លីៗ ដែលមានថ្នាំងមួយៗ រួចហើយគេដាក់តំរៀបគ្នាក្នុងថ្នាលមួយក្បែរប្រភពទឹកដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការស្រោចស្រព ។

- កំណាត់ដើមអំពៅដែលគេតំរៀបគ្នានោះមិនត្រូវលុបដីឱ្យជិតតែម្តងទេ ហើយត្រូវដាក់ភ្នែកថ្នាំងអំពៅនៅលើដើម្បីបង្កការងាយស្រួលក្នុងការដុះពន្លកហើយ



ដើម្បីឱ្យកាន់តែប្រសើរត្រូវគ្របចំបើងពីលើ ។

- ជាទូទៅគេត្រូវស្រោចទឹកមួយថ្ងៃម្តងដើម្បីឱ្យកូនអំពៅនោះលូតលាស់បានល្អ ។ ពេលដែលកូនអំពៅនោះលាស់បានល្អមានទំហំដើមប៉ុនម្រាមដៃ ហើយដែលមានអាយុប្រមាណជា ១ ខែទើបគេយកទៅដាំនៅចំការ ។

- ការដាក់ដាំកំណត់ដើមៈ វិធីនេះគេអនុវត្តន៍ចំពោះដីចំការធំៗដែលជួនកាលការកាប់រណ្តៅអាចត្រូវចំណាយថវិកាច្រើន ។ ការដាំដុះតាមវិធីនេះគេអាចអនុវត្តន៍បានពេលដែលចំការមានដីសើមល្មម ។ វិធីនេះអាចចំណាយទុនតិច និងឆាប់រហ័សទៀតផងប៉ុន្តែវា មានគុណវិបល្លាស្ទិយៗ គឺអាចបណ្តាលឱ្យដើមដុះមិនបានល្អក្នុងចំការពេលដែលពុំមានភ្លៀងធ្លាក់គ្រប់គ្រាន់ ។



- ការស្រោចទឹក

ជាទូទៅគេកាត់ពូជជាកង់ៗមាន ៣ ថ្នាំងនិងភ្នែក៣ ល្អៗ ។ ដើមដែលជ្រើសរើសយកមកធ្វើជាពូជជាដើមដែលមានអាយុប្រមាណជា ៧ ខែ ទើបជាពូជដែលមានគុណភាពល្អ ។ មិនត្រូវយកផ្នែកខាងគល់ពេក ឬចុងពេកមកធ្វើពូជឡើយ ព្រោះវា





អាចដុះមិនសូវល្អ ។ ម្យ៉ាងទៀតជៀសវាង
យកដើមណាស្តមហើយមានកើតជម្ងឺ ។
កំណាត់ដើមអំពៅ ដែលគេយកមកធ្វើ
ពូជដាំរួមមាន : ថ្នាំង និងភ្នែក (ពន្លក)
៣ ល្អ ។

- មុនពេលដាំគេត្រូវឆ្លុះរង ឬ
គន្លង ដែលមាន ចន្លោះឃ្លាតពីគ្នា ០,៩០ម
ទៅ ១,២០ ម ។ រួចហើយគេបោះពូជទៅ
បាតរង ហើយគេត្រូវរាស់លុប ឬ ឆ្លុះលុប
តែម្តង ។

- ក្នុងការបោះពូជ គេអាចបោះ
កំណាត់ពូជនូវចន្លោះឃ្លាតពីពូជមួយទៅពូជ
មួយ ឬ ពីគុម្ពមួយទៅគុម្ពមួយឃ្លាត ពីគ្នា
ប្រមាណ ជា ០,៥០ ទៅ ០,៦០ ម ។

-វិធីម្យ៉ាងទៀតគេអាចបោះទាំង
ដើមវែង តែម្តងរួចហើយគេកាប់ដើម
ជាកងៗក្នុងចំការតែម្តង ។

-ការដាំក្នុងរណ្តៅ: ចំពោះការដាំ

ក្នុងរណ្តៅ គឺគេដាក់ក្នុងមួយរណ្តៅពីរកំណាត់ពូជ ។ នៅបាតរណ្តៅគេដាក់ដីធម្មជាតិ
 លាយជាមួយដីគីមីបន្តិចគឺប្រមាណជា ៥០ ក្រាមដីគីមី និង ដីធម្មជាតិប្រមាណជា
 ០,៥ ទៅ ១,០ គ.ក្រ ក្នុងមួយរណ្តៅ ។ ចន្លោះឃ្លាតនៃរណ្តៅ ១ ម x ០,៨ម
 និងទំហំ ០,៣៥ម បួនជ្រុង ដែលមានជំរៅប្រមាណជា៣០ ស.ម ។ ការដាំដោយដាក់
 កំណាត់ដើមនេះ មានលក្ខណៈងាយស្រួលម្យ៉ាងគឺយើងចំណាយទុនតិច ពុំចាំបាច់ធ្វើ
 ការស្រោចស្រព ហើយដំណាំអាចដុះលូតលាស់បានអាស្រ័យទៅដោយទឹកក្នុងដី
 និងទឹកភ្លៀងធ្លាក់ ។ នៅប្រទេសកម្ពុជាយើង កសិករនិយមដាំអំពៅម្តងហើយប្រមូល
 ផលម្តង ។ នៅប្រទេសគេភាគច្រើនពេលដែលគេដាំលើចំការធំៗគេដាំម្តងហើយ



គេអាចប្រមូលផលរហូតដល់ ៣ ទៅ ៤ ដង ក្នុង អំឡុងពេល ៥ ឆ្នាំ ។ នៅប្រទេស
ជឿនលឿនខ្លះទៀតមានចំការអំពៅ ដែលមានអាយុរហូតដល់ទៅ ១០ ទៅ ១៥ឆ្នាំ
ហើយគេអាចប្រមូលផលបានពី ៨ ទៅ ១២ ដង ។

ឃ. កាបូនក្រូច : ដំណាំអំពៅជាដំណាំមួយប្រភេទដែលត្រូវការជីច្រើនគួរសម
ក្នុងចំណោមជីជាតិចិញ្ចឹមសំខាន់ៗ ដំណាំអំពៅត្រូវការជីប៉ូតាស្យូម ច្រើនជាងគេព្រោះ
ដំណាំអំពៅជាដំណាំមួយដែលបង្កើតជាតិស្ករ ។ បរិមាណនៃជាតិប៉ូតាស្យូមដែលត្រូវ
ដាក់ស្ទើរស្មើនឹងជីអាហ្សូតដែរ ។ ចំពោះលក្ខខណ្ឌប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលកសិករ
ដាំមួយឆ្នាំតែម្តង និងប្រមូលផលតែម្តងនោះ គឺយើងអាចណែនាំឱ្យកសិករយើងដាក់ជី
១៥.១៥.១៥ ប្រមាណ ២០០ គ.ក្រ/ហ.ត ។ បើករណីយើងដាំអំពៅសំរាប់ធ្វើ



ស្តុកដូច្នេះយើងត្រូវដាក់ជីគីមីនូវបរិមាណជា ៤០០ គ.ក្រ ១៥.១៥.១៥ ក្នុងមួយហិកតា ដើម្បីធានាបានទិន្នផលស្ករច្រើន ។ ការដាក់ជីលើដំណាំអំពៅជាទូទៅ គឺគេដាក់ តែម្តងប៉ុណ្ណោះនៅពេលដាំ ហើយគេកម្រនឹងដាក់ ជីអ៊ុយរ៉េបំប៉នម្តងទៀត ណាស់ ព្រោះអាចបណ្តាលឱ្យប៉ះពាល់ដល់ទិន្នផលស្ករ ។ ក្នុងករណីចំការដែលយើង ដាំម្តងហើយធ្វើការប្រមូលផលពី ២ ទៅ ៣ ដងនោះការដាក់ជីត្រូវដាក់ក្រោយ ពេល ប្រមូលផលលើកទី ១ជាថ្មីម្តងទៀតនូវបរិមាណដូចទៅនឹងការដាក់ នៅពេលដាំ ប៉ុន្តែត្រូវបន្ថែមជីអ៊ុយរ៉េមួយកំរិតថែមទៀតគឺប្រមាណពី ៥០ ទៅ ១០០ គ.ក្រ /ហិកតា ដើម្បីជំនួយដល់ការដុះលូតលាស់របស់កូនអំពៅថ្មី ។

៦. ការសំអាតស្មៅ: ការសំអាតស្មៅមានសារៈប្រយោជន៍ណាស់សំរាប់



ដំណាំអំពៅ ។ ការសំអាតស្មៅគេត្រូវចាប់ផ្តើមអនុវត្តចាប់ពីពេលដែលយើងដាំរហូតដល់ដើមអំពៅមានស្លឹកធំជិតដំបូង ។ បើក្នុងចំការមានស្មៅតាំងពីពេលដាំរហូតដល់ពេលអំពៅមានអាយុ ៤៥ ថ្ងៃ គឺអាចបណ្តាលឱ្យថយចុះទិន្នផលស្កររហូតដល់ ១២ % បើធៀបទៅនឹងចំការដែលគ្មានស្មៅ ។ ត្រូវពូនគល់ដើម្បីជំនួយដល់ការដុះលូតលាស់នៃខ្លែងអំពៅ ដែលជាកត្តាមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្តល់ទិន្នផល ។ ការជំរះស្មៅ គឺយើងអាចធ្វើដោយចប ហើយចំពោះដីចំការធំ គេអាចធ្វើដោយដោយគ្រឿងយន្ត ។ ចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងពេលដែលគេដាំនៅរដូវទឹកសំរក ក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ជាដំបូងគេអាចជំរះស្មៅមួយដង ឬ ពីរដងហើយរហូតដល់ពេលធ្លាក់ភ្លៀង ស្មៅដុះថ្មីទើបគេជំរះម្តងទៀត ។

V. ការប្រមូលផល

ការប្រមូលផលដំណាំអំពៅនៅប្រទេសកម្ពុជាយើង គឺគេអាចធ្វើឡើងដោយយោងតាមលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុ និងទីផ្សារ ។ ប៉ុន្តែជាទូទៅគេប្រមូលផលពេលដែលដំណាំមានអាយុប្រមាណជា ១០ ទៅ ១៣ ខែបន្ទាប់ពីដាំ ។ ចំពោះការដាំអំពៅសម្រាប់គ្រាន់តែលក់ដើម្បីតាបទឹកហូប ការប្រមូលផលពុំសូវមានបញ្ហាអ្វីចោទឡើងទេ គឺគេអាចប្រមូលផលក្នុងអំឡុងខែកញ្ញា គឺពេលអំពៅមានអាយុ ១០ ខែមុនពេលទឹកលិច ថ្ងៃត្បិតតែក្នុងពេលនេះក្នុងដើមពុំសូវមានជាតិស្ករក៏ដោយ ។ ចំពោះការដាំដុះអំពៅសំរាប់ធ្វើស្ករ ពេលវេលានៃការប្រមូលផលគឺក្នុងអំឡុងពេលខែធ្នូ ឬ មករា ព្រោះត្រឹមខែនេះអំពៅមានអាយុពី ១២ ទៅ ១៣ ខែ និងជាពេលដែលអាកាសធាតុត្រជាក់



ហើយអំពៅមានជាតិស្ករច្រើន ។ ការប្រមូលផលនៅចំការធំៗជួនកាលគេដុតចំការជាមុនសិន ទើបគេកាប់ដើមអំពៅក្នុងករណីនេះ គេត្រូវកាប់អំពៅភ្លាម និងប្រញាប់យកទៅរោងចក្រ ព្រោះបើទុកចោលលើសពី ៣ ថ្ងៃអាចបណ្តាលឱ្យខូចគុណភាពស្ករ ។